



## Schéma de pulvérisation pour fraises 2022



Période	Maladie ou ravageur	Traitement (dose / are)	Remarques
directement après la plantation	Phytophthora	Paraat 0,1 g par plante	par arrosage
2 semaines après la plantation	Phytophthora	Previcur Energy (champs de multiplication et sélection) 80 ml OU Aliette 50 g	Aliette : ne pas mélanger avec d'autres produits
début sept (après constatation)	pucerons, tarsonèmes, mouches blanches	Movento 10 ml	appliquer en conditions de croissance
1 mois après le premier traitement	Phytophthora	Aliette 50 g	ne pas mélanger avec d'autres produits
2 <sup>ème</sup> semaine de septembre	oïdium	Nimrod 250 EC 10 ml	
fin septembre	acariens, tarsonèmes	Vertimec 5 ml	
octobre	oïdium	Flint 1,5 g	rajouter Topaz 5 ml ou Systhane 20 EW 5 ml si conditions curatives après infection
février / mars	Botrytis	Teldor 15 g	appliquer 2 fois, intervalle 7 - 10 jours
début de la croissance	Phytophthora	Aliette 50 g	
début de la croissance	thrips, chenilles, coléoptères	Decis 15EW 5 ml	
avril	oïdium, Botrytis, Colletotrichum	Flint 1,5 g + Teldor 15 g	
fin avril	Phytophthora	Paraat 0,1 g/plante	par système goutte-à-goutte
fin avril	mouches blanches, pucerons	Movento 7,5 ml OU Flipper 1%	Movento au stade 5 feuilles, Flipper seulement agréé sous protection
début floraison	Botrytis, oïdium	Luna Sensation 8 ml	
lors de la présence de thrips	thrips	Tracer 1,5 ml	
25% floraison	Botrytis, oïdium	Switch 10 g	
pendant la culture si présence ravageur	pucerons, mouches blanches	Sivanto Prime 6,25 ml	Sivanto Prime seulement agréé sous protection
fin floraison	Botrytis, Colletotrichum, oïdium, maladies de conservation	Luna Sensation 8 ml	
juste avant la première cueillette	Botrytis	Serenade ASO 40 ml	
pendant la récolte	forte pression d'acariens	Floramite 4 ml + Apollo 4 ml	
entre les récoltes (par temps humide)	Botrytis	Teldor 15 g	décal avant récolte: 1 jour
entre les récoltes (par temps humide)	mouches blanches, pucerons et acariens	Flipper 1%	aucun résidu

### Ajuster les pulvérisations avec les observations au champ

**Sivanto Prime: ne pas appliquer avec des fongicides de la classe de résistance (3)(triazoles) sur des plantes qui sont en floraison ou qui sont visitées par des abeilles**

### DESHERBAGE

Période	Mauvaises herbes	Traitement (dose / are)	Remarques
14 jours après la cueillette	dicotylées	Fenmedifam (160 g / l) 30 ml + Devrinol 10 ml	sur mauvaises herbes en germination total max. 9,6 g fenmedifam / are / année
mi septembre	dicotylées	Fenmedifam (160 g/ l) 30 ml + Devrinol 10 ml + Dual Gold 5 ml	lors de nouvelle repousse total max. 9,6 g fenmedifam / are / année
juste avant la floraison	dicotylées et graminées	Fusilade Max 15 ml / are de bande par temps ensoleillé	avec cache de protection entre les lignes

Les données mentionnées dans cette brochure couvrent autant que possible une saison culturale moyenne et reposent sur notre expérience pratique en matière d'essais ainsi que sur des observations réalisées chez les cultivateurs. Elles sont données à titre purement informatif. L'utilisateur doit toujours prendre connaissance des indications d'emploi en matière de produits phytosanitaires ainsi que des mesures de précaution telles que la législation le prévoit. Elles sont renseignées sur l'étiquette présente sur le flacon des produits phytosanitaires. Veuillez tenir compte du fait qu'un programme de protection moderne n'est pas statique, mais doit être adapté en fonction de chaque situation.

Bayer CropScience ne peut pas être tenu responsable d'une éventuelle mauvaise efficacité de l'un ou l'autre produit cité dans ce schéma et aussi de certains incidents qui pourrait être liés à l'utilisation de ces produits. Pour plus d'informations, aidez-vous des conseils de votre distributeur.



## Schéma de pulvérisation pour fraises 2022



### Composition des produits

Aliette WG: n° d'agr.8692P/B; contient 80% fosetyl; marque déposée Bayer  
Apollo: n° d'agr. 7477P/B; contient 500 g/l clofentezin; marque déposée Adama  
Decis 15 EW: n° d'agr. 10646P/B; contient 15 g/l deltaméthrin; marque déposée Bayer  
Devrind: erk.nr 7716P/B; contient 450 g/l napropamide; marque déposée UPL Europe  
Dual Gold: n° d'agr. 9244P/B; contient 960 g/l S-metolachloor; marque déposée Syngenta  
Flint 50 WG: n° d'agr. 9144P/B; contient 50% trifloxystrobine; marque déposée Bayer  
Floramite 240 SC: n° d'agr. 9462P/B; contient 240 g/l bifenazaat; marque déposée Arysta LifeScience  
Flipper: n° d'agr. 10935P/B; 479,8 g/l sel de potassium d'acides gras; marque déposée Alpha Biopesticides Limited  
Fuslade Max: n° d'agr. 9476P/B; contient 125 g/l fluazifop-p-butyl; marque déposée Nufarm  
Luna Sensation: n° d'agr. 10492P/B; contient 250 g/l fluopyram et 250 g/l trifloxystrobine; marque déposée Bayer  
Movovento 100 SC: n° d'agr. 9797P/B; contient 100 g/l spirotetramat; marque déposée Bayer  
Nimrod 250 EC: n° d'agr. 10772P/B; contient 250 g/l bupirimaat; marque déposée Adama  
Pareaat: n° d'agr. 8553P/B; contient 50% diméthomorf; marque déposée BASF  
Previcur Energy: n° d'agr. 9826P/B; contient 310 g/l foséthyl et 530 g/l propamocarb; marque déposée Bayer  
Serenade ASO: n° d'agr. 10299P/B; contient 13,96 g/l bacillus subtilis strain QST 713; marque déposée Bayer  
Sivanto Prime: n° d'agr. 10855P/B; contient 200 g/l flupyradifuron; marque déposée Bayer  
Switch: n° d'agr.8893P/B; contient 37,5% cyprodinil en 25% fludioxonil; marque déposée Syngenta  
Teldor: n° d'agr. 9059P/B; contient 50% fenhexamid; marque déposée Bayer  
Tracer: n° d'agr. 9275P/B; contient 480 g/l spinosad; marque déposée Dow Agrosiences  
Vertimec: n° d'agr. 8511P/B; contient 18 g/l abamectine; marque déposée Syngenta