



Schéma de pulvérisation pour poires 2022

Dose par Ha de verger standard (y compris les pourtours)



Période	Maladie ou ravageur	Traitement	Remarques
gonflement des boutons (fin février)	chancre, tavelure sur rameau	25% hydroxyde de cuivre 8 kg + soufre	en moyenne max 4 kg de cuivre par an et par ha (max 28kg cuivre / 7 ans)
gonflement des boutons (fin février)	psylle	Surround 20 - 30 kg	jusque début floraison, veillez à une bonne couverture
gonflement des boutons (fin février)	psylle, acariens, pucerons, punaises	Vermotex 9,3 L	
éclatement des boutons	tavelure	Syllit Pro 1,25 L	
oreilles de souris	tavelure	Captan 1,8 kg	
fleurs différenciées	tavelure	Captan 1,8 kg + Scala 0,75 L	Scala en curatif après l'infection
bouton vert	tavelure, chancre	Captan 1,8 kg	
avant floraison	pucerons	Sivanto Prime 0,4 L	remarque: traiter seulement les 2 mètres inférieurs de l'arbre; si 0,6 L/ ha alors 1 x / 2 ans
bouton blanc - stade ballon	tavelure	Captan 1,8 kg (+ Geyser 0,15 L)	T° > 12 °C pour Geyser et seulement en curatif après l'infection
début floraison	feu bactérien	Serenade ASO 4 L	effet secondaire sur Pseudomonas, 1 à 2 applications avec un intervalle de 3 à 5 jours, en fonction de l'avancement de la floraison
30 % floraison (facultatif)	mise à fruit ou parthénocarpie (par gel nocturne)	GA4/7 ou GA-3	en fonction de la qualité des boutons et des conditions climatiques pendant la floraison
pleine floraison	tavelure, oïdium, Stemphyllium, rouille	Luna Experience 0,75 L + Captan 1,8 kg	
fin floraison	tavelure, oïdium, tordeuses, carpocapse	Flint 0,15 kg + Captan 1,8 kg + Steward 0,25 kg	
fin floraison	tavelure, oïdium, Stemphyllium, feu bactérien, maladie des boutons morts(Pseudomonas)	Luna Care 3 kg	n'oublier pas de pendre les pièges de confusion sexuelle avant le 1er mai
oeufs blancs psylle(+/- 3 mai)	psylle	Harpun 0,9 L	technique de pulvérisation !
8 à 10 jours après la première application	tavelure, oïdium, Stemphyllium, feu bactérien, maladie des boutons morts(Pseudomonas)	Luna Care 3 kg	
éclosion psylle G2 (+/- 10 mai)	psylle, cochenille, cécidomyies	Movento 2,25 L	rémanence de 3 à 4 semaines !
3ème semaine de mai	maladies bactériennes, tavelure, oïdium, Stemphyllium,	Aliette 3,75 kg + Flint 0,15 kg	
21 jours après la première application	psylle	Movento 2,25 L	rémanence de 3 à 4 semaines !
juin	carpocapse	Coragen 0,18 L	rémanence de 3 à 4 semaines !
août	maladies de conservation + carpocapse	Switch 0,75 kg + Xentari 1,5 kg	6 semaines avant la cueillette
août	maladies de conservation	Captan 1,8 kg	4 semaines avant la cueillette
septembre	maladies de conservation	Pomax 1,35 kg	1 semaine avant la cueillette
septembre	maladies de conservation	Geoxe 0,375	3 jours avant la cueillette
après la cueillette	chancre	Captan 1,8 kg	
après la cueillette	chancre	40% hydroxyde de cuivre 3,145 kg	en moyenne max 4 kg de cuivre par an et par ha
après la cueillette	psylle, pucerons	Decis EW 0,71L (contre adultes)	

Appliquer au max 4 SDHIs par année (Luna Privilège, Luna Experience, Luna Care, Sercadis, Bellis)

Appliquer max 500gr Fluopyram par an (Luna Privilège, Luna Experience, Luna Care)

Faire les traitements en fonction des observations au champ

DESHERBAGE Dose par ha traité (à diviser par 2 pour la dose par ha de bande)

Période	Traitement	Remarques
avant floraison	Roundup 4 L (360g/l) ou 3 L (480g/l)	seulement à partir de la seconde année de croissance
après floraison	Duplosan Super 2,6 L	
été	Kerb 1,55 L + AZ500 1L	

Les données mentionnées dans cette brochure couvrent autant que possible une saison culturale moyenne et reposent sur notre expérience pratique en matière d'essais ainsi que sur des observations réalisées chez les cultivateurs. Elles sont données à titre purement informatif. L'utilisateur doit toujours prendre connaissance des indications d'emploi en matière de produits phytosanitaires ainsi que des mesures de précaution telles que la législation le prévoit. Elles sont renseignées sur l'étiquette présente sur le flacon des produits phytosanitaires. Veuillez tenir compte du fait qu'un programme de protection moderne n'est pas statique, mais doit être adapté en fonction de chaque situation. Bayer CropScience ne peut pas être tenu responsable d'une éventuelle mauvaise efficacité de l'un ou l'autre produit cité dans ce schéma et aussi de certains incidents qui pourraient être liés à l'utilisation de ces produits. Pour plus d'informations, aidez-vous des conseils de votre distributeur.



Schéma de pulvérisation pour poires 2022

Dose par Ha de verger standard (y compris les pourtours)



Composition des produits

Aliette WG: n° d'agr. 8692P/B; contient 80% fosétyl; marque déposée Bayer
AZ500: n° d'agr. 7573P/B; contient 500 g/l isoxaben; marque déposée Dow Agrosciences
Captan: n° d'agr. 8759P/B; contient 80% captan; marque déposée ADAMA
Coragen: n° d'agr. 9822P/B; contient 200g/l chloorantraniliprole; marque déposée FMC Chemical SPRL
Decis 15 EW: n° d'agr. 10646P/B; contient 15 g/l deltaméthrin; marque déposée Bayer
Duplosan Super: n° d'agr. 10803P/B; contient 600g/l mecoprop-p; marque déposée Nufarm
Flint 50 WG: n° d'agr. 9144P/B; contient 50% trifloxystrobine; marque déposée Bayer
Geoxe: n° d'agr. 10250P/B; contient 50% fludioxonil; marque déposée Syngenta
Geysler: n° d'agr. 8256P/B; contient 250 g/l difenoconazol, marque déposée Syngenta
Harpun: n° d'agr. 10800P/B; contient 100 g/l pyriproxifen; marque déposée Galenika-Fitofarmacija
Kerb: n° d'agr. 9606P/B; contient 400 g/l propyzamide; marque déposée Dow Agrosciences
Luna Care: n° d'agr. 10978P/B; contient 5% fluopyram et 66,6% fosétyl; marque déposée Bayer
Luna Experience: n° d'agr. 10432P/B; contient 200 g/l fluopyram et 200 g/l tebuconazole; marque déposée Bayer
Movento 100 SC: n° d'agr. 9797P/B; contient 100 g/l spirotetramat; marque déposée Bayer
Pomax: n° d'agr. 10677P/B; contient 133 g/l fludioxonil et 336 g/l pyriméthanil; marque déposée Globachem
Roundup: marques déposées Bayer
Scala: n° d'agr. 8579P/B; contient 400 g/l pyriméthanil, marque déposée BASF
Serenade ASO: n° d'agr. 10299P/B; contient 13,96 g/l Bacillus Amylolyquefaciens strain QST713, marque déposée Bayer
Sivanto Prime: n° d'agr. 10855P/B; contient 200 g/l flupyradifuron; marque déposée Bayer
Steward: n° d'agr. 9328P/B; contient 30% indoxacarb, marque déposée FMC
Surround WP Crop Protectant; n° d'agr. 9824P/B; contient 95% aluminiumsilicaat; marque déposée Tessenderlo Group
Switch; n° d'agr. 8893P/B; contient 37,5% cyprodinil en 25% fludioxonil; marque déposée Syngenta
Syllit Pro: n° d'agr. 10597P/B; contient 544 g/l dodine; marque déposée Arysta Lifescience
Trend: n° d'agr. 9002P/B; contient 900g/l isodécyl-alcool-éthoxyfate, marque déposée FMC
Vernotex; n° d'agr. 6556P/B; contient 850g/l paraffineolie; marque déposée door Protex
Xentari WG: n° d'agr. 9067P/B; contient 15000I.U. Trichoplusia ni/mg Bacillus Thuringiensis ssp aizawai ABTS-1857; marque déposée Valent Biosciences