



Archipel[®] Star

600 g

SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, WINTERROGGE, ZOMERROGGE, WINTERTRITICALE, ZOMERTRITICALE, WINTERSPELT EN ZOMERSPELT TER BESTRIJDING VAN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN ÉÉNJARIGE TWEENZAADLOBBIGE ONKRUIDEN.

HERBICIDE DE POST-EMERGENCE SELECTIEF EN FROMENT D'HIVER, FROMENT DE PRINTEMPS, SEIGLE D'HIVER, SEIGLE DE PRINTEMPS, TRITICALE D'HIVER, TRITICALE DE PRINTEMPS, ÉPEAUTRE D'HIVER ET ÉPEAUTRE DE PRINTEMPS CONTRE LES GRAMINÉES ET DICOTYLEES ANNUELLES.

Mode d'action/Werkingswijze

GROUP	B	HERBICIDES
-------	----------	------------

Hier openen/Ouvrir ici

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
P391 Recueillir le produit répandu.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Information supplémentaire

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautirritationen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz tragen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergänzende Informationen

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Toelatingsnummer: 10634P/B

Water dispergeerbaar granulaat (WG)
op basis van 4.5 % iodosulfuron-methyl-natrium,
4.5 % mesosulfuron-methyl, 3.75 % thiencarbazone-methyl
en 13.5 % mefenpyr-diethyl.

Archipel[®] Star Trademark of Bayer Group
Actirob[®] B Marque déposée/Gedeponeerd handelsmerk Oleon NV

Lotnummer/N° du Lot :
zie op de verpakking/Voir sur l'emballage

Labelversie 05/2019

© Copyright Bayer CropScience

BE85348671C

Número d'autorisation: 10634P/B

Número d'agrément Luxembourgeois: L02243-017
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
à base de 4.5% d'iodosulfuron-méthyl-sodium, 4.5% de
mesosulfuron-méthyl, 3.75% de thiencarbazone-méthyl
et 13.5% de méfenpyr-diéthyl (safener).

GHS07



GHS09



**Waarschuwing
Attention
Achtung**



Toelatingshouder/Détenteur d'autorisation :

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
Tel. 02/535 63 11
www.cropscience.bayer.be

Bayer

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstijdstip
Winter- en zomertarwe, winter- en zomerrugge, winter en zomertriticale, winterspelt en zomerspelt (ook voor zaadproductie) (open lucht)	Eénjarige grasachtige onkruiden (<i>Poaceae annual</i>) zoals duist (<i>Alopecurus myosuroides</i>), windhalm (<i>Apera spica-venti</i>), straatgras (<i>Poa annua</i>), raaigras (<i>Lolium</i> spp.) en wilde haver (<i>Avena fatua</i>) & éénjarige tweezaadlobbige onkruiden (<i>Dicotyledoneae annual</i>).	0,2 kg/ha + 1 L/ha van een product op basis van geësterde koolzaadolie, bv Actirob® B	In de lente, vanaf het stadium begin uitstoeiing (BBCH 21) tot en met het 2e knoop-stadium (BBCH 32) van het graangewas.
	Toepassingsvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none">• Max. 1 toepassing/teelt• Risicobeperkende maatregelen: altijd minimum 90 % driftreductie toepassen over het volledige veld. Bovendien een minimale bufferzone van 1 meter respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		

Algemene opmerkingen/aanbevelingen

- Archipel® Star moet altijd toegepast worden in combinatie met een daartoe erkend product op basis van een veresterde plantaardige olie aan de dosis van 1 L/ha (type Actirob® B).
- Archipel® Star toepassen bij groeizaam weer (relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60 %) en op een gezond graangewas. Niet toepassen op een gewas dat verzwakt of beschadigd is door vorst, wateroverlast, ziekten of gebrekkigheden. Indien nachtvorst verwacht wordt, zal de toepassing enkele dagen uitgesteld worden. Om een optimale bladopname te bekomen mag er geen neerslag vallen binnen de vier uur na de toepassing.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen. Bij verlaging van de dosis is het niet toegestaan het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik
- Granen met onderzaai van grassen of vlinderbloemigen mogen niet met Archipel® Star behandeld worden.

Maatregelen ter voorkoming van resistentievorming:

- Archipel® Star is een herbicide van de familie van de sulfonylureum-verbindingen met een 'ALS'-werkwijze (HRAC groep B). Het product mag slechts éénmaal per teelt toegepast worden. Volgende richtlijnen dienen te worden gevolgd om resistentie tegen herbiciden met een 'ALS'-werkingswijze te voorkomen:
- Een maximaal resultaat wordt verzekerd door gebruik van de erkende dosis tegen het bedoelde onkruidgras en door het product toe te passen bij de beste weersomstandigheden op een nog weinig ontwikkeld onkruid.
 - Een behandeling met Archipel® Star niet laten volgen op of laten voorafgaan door een ander 'ALS'- herbicide tegen grassen.
 - In sommige streken (zoals de Polders) is resistentie duist of windhalm, of duist of windhalm die minder gevoelig is aan herbiciden van de FOP-familie of de ureumverbindingen (zoals chloortoluron) reeds sterk verspreid. In deze situaties is het uitvoeren van een spuitschema noodzakelijk; namelijk een najaarsbehandeling gevolgd door een voorjaarsbespuiting, met herbiciden met verschillende werkingswijzen. De bestrijding niet baseren op grassenmiddelen die dezelfde werkingswijze hebben. Gebruik in opeenvolgende gewassen van de teeltrotatie grassenmiddelen die een verschillende werkingswijze hebben.

Reiniging spuitapparatuur:

Archipel® Star behoort tot de groep van de sulfonylureum-verbindingen. Daarom is het uiterst belangrijk de tank goed te reinigen (inclusief filters en leidingen) alvorens een bespuiting uit te voeren in een andere teelt dan de teelten waarin het product toegelaten is.

Volgteelten:

- Na de oogst van granen behandeld met Archipel® Star, zijn volgende teelten mogelijk na een grondbewerking van 10-15 cm: wintertarwe, wintergerst, zomergest, rogge, spelt, triticale, haver, aardappelen, bieten, cichorei, maïs, vlas, stamslabonen, voedererwten, mosterd, Phacelia, raaigras en wikkens.
- Koolzaad is mogelijk na ploegen.
- De zaai of het planten van elke andere teelt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Vervangteelten:

Gelieve uw distributeur of Bayer CropScience te contacteren voor meer informatie over de mogelijke vervanggewassen na een teeltmislukking.

Mengbaarheid:

In geval van tankmenging met andere fytoproducten, eerst het granulaat (WG) in het water van de spuittank laten oplossen. Nadien de andere producten (poeders gevolgd door vloeistoffen) aan de spuitoplossing toevoegen.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen. De zorgvuldig geleidigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek "gebruik en gebruiksdosissen".
- SPe3: Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek "gebruik en gebruiksdosissen".
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.
- Driftreductie: Vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterlevel en rijnsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen.
- Erosiegevoelige percelen: Het is ten zeerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden na het de spuitvloeistof is opgedroogd.
- Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.
- Dit product in een originele gesloten verpakking voorstribbewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Spoel WEG van het aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het **Antigifcentrum 070/245.245**.

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven, wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Froment d'hiver & de printemps, seigle d'hiver & de printemps, triticale d'hiver & de printemps et épeautre d'hiver et de printemps (aussi pour la production des semences) (plein air)	Les mauvaises herbes graminées annuelles (<i>Poaceae annual</i>) telles que vulpin des champs (<i>Alopecurus myosuroides</i>), jouet du vent (<i>Apera spica-venti</i>), pâturin annuel (<i>Poa annua</i>), ray-grass (<i>Lolium spp.</i>), folle-avoine (<i>Avena fatua</i>) & les dicotylées annuelles (<i>Dicotyledoneae annual</i>).	0,2 kg + 1 L/ha d'un produit à base d'huile de colza estérifiée, p.e. Actirob® B	Au printemps du début tallage (BBCH 21) jusqu'au stade deuxième nœud inclus (BBCH 32) de la céréale.
	Conditions d'application : <ul style="list-style-type: none">• Max. 1 application/culture.• Mesures de réduction du risque: toujours appliquer un pourcentage minimum de 90 % de réduction de la dérive sur toute la parcelle. En plus, respecter une zone tampon minimale de 1 mètre entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Remarques/Recommandations générales <ul style="list-style-type: none">• Archipel® Star doit toujours être utilisé en combinaison avec un produit autorisé sur la base d'une huile végétale estérifiée (type Actirob B®), à la dose de 1 L/ha.• Archipel® Star s'utilise par temps poussant (humidité relative supérieure à 60 %) et sur une culture saine, qui n'est pas affaiblie ou endommagée par le gel, un surplus d'eau, des maladies cryptogamiques ou une carence. En cas de gelée nocturne attendue, l'application sera retardée de quelques jours. Afin d'obtenir une absorption foliaire optimale, ne pas traiter si de la pluie est attendue endéans les 4 heures après l'application. Remarque générale concernant la dose <p>La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.</p>			

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel
- Des céréales avec un sous-semis de graminées ou de légumineuses ne peuvent pas être traités avec Archipel® Star.

Mesures pour la prévention du développement de la résistance

Archipel® Star est un herbicide de la famille des sulfonyles à mode d'action dit „ALS“ (HRAC groupe B). Le produit ne peut être appliqué qu'une seule fois par culture. Pour prévenir l'apparition de mauvaises herbes résistantes aux herbicides à mode d'action „ALS“, respecter les consignes suivantes:

- Assurer un résultat maximum en utilisant la dose agréée sur la graminée visée, en appliquant le produit dans les meilleures conditions climatiques et en traitant des graminées adventices peu développées.
- Un traitement avec Archipel® Star ne peut pas précéder ou suivre un traitement avec un autre herbicide anti-graminées à mode d'action ALS.
- Dans certaines régions (dont les Polders), des vulpins ou jouet du vent résistants ou moins sensibles aux herbicides de la famille des FOP's et des urées (dont le chlortoluron) sont déjà bien répandus. Dans ces situations, la mise en place d'un schéma de traitements incluant un traitement automnal suivi d'un traitement au printemps avec des produits à mode d'action différent est impératif. Ne pas baser la lutte sur des herbicides anti-graminées possédant le même mode d'action. Utiliser des herbicides anti-graminées à mode d'action différent dans les cultures qui se suivent dans la rotation.

Nettoyage du pulvérisateur:

Archipel® Star est un herbicide de la famille des sulfonyles; de ce fait, il est très important de bien nettoyer la cuve, les tuyaux et les filtres avant de passer dans une autre culture que les cultures dans lesquelles le produit est autorisé

Cultures suivantes:

- Après la récolte de céréales traités avec le Archipel® Star, les cultures suivantes sont possible après un travail de sol de 10 à 15 cm: froment d'hiver, froment de printemps, escourgeon, orge de printemps, seigle, épeautre, triticale, avoine, pomme de terre, betteraves, chicorée, maïs, lin, haricots verts, pois protéagineux, moutarde, phacelia, ray-grass et vesces.
- Le colza est possible après un labour.
- L'implantation de toute autre culture se fera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Cultures de remplacement:

Pour des informations concernant les cultures de remplacements possibles en cas d'échec de la culture veuillez contacter votre distributeur ou Bayer CropScience.

Compatibilité:

En cas de mélange avec d'autres produits phyto, laisser d'abord dissoudre le granulé (WG) dans l'eau de la cuve. Ajouter ensuite les autres produits (d'abord les poudres et ensuite les liquides) à la bouillie de pulvérisation.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique "Usage et doses d'emploi".
- SPe3: Pour protéger les plantes non-ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique "Usage et doses d'emploi".
- En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.
- Réduction de la dérive: Eviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses anti-dérive.
- Parcelles sensibles à l'érosion : Il est recommandé de mettre en place des mesures adaptées sur les parcelles sensibles à l'érosion afin d'empêcher le ruissellement vers les eaux de surface.

MESURES DE PRECAUTION

- SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytosanitaires.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	
EN CAS D'INGESTION:	Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
EN CAS D'INHALATION:	Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:	Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Pour des informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245. Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500	

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur: nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



Archipel® Star

600 g

SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, WINTERROGGE, ZOMERROGGE, WINTERTRITICALE, ZOMERTRITICALE, WINTERSPELT EN ZOMERSPELT TER BESTRIJDING VAN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN ÉÉNJARIGE TWEezaadlobbige ONKRUIDEN.

HERBICIDE DE POST-EMERGENCE ELICOTIF EN FROMENT D'HIVER, FROMENT DE PRINTEMPS, SEIGLE D'HIVER, SEIGLE DE PRINTEMPS, TRITICALE D'HIVER, TRITICALE DE PRINTEMPS, ÉPEAUTRE D'HIVER ET ÉPEAUTRE DE PRINTEMPS CONTRE LES GRAMINÉES ET DICOTYLEES ANNUELLES.

Mode d'action/Werkingswijze

GROUP B HERBICIDES

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
P391 Recueillir le produit répandu.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Information supplémentaire

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautirritationen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz tragen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergänzende Informationen

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Toelatingsnummer: 10634P/B
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
op basis van 4.5 % idosulfuron-methyl-natrium,
4.5 % mesosulfuron-methyl, 3.75 % thien-carbazone-methyl
en 13.5 % mefenpyr-diethyl.

Archipel® Star Trademark of Bayer Group
Actirob® B Marque déposée/Gedeponeerd handelsmerk Oleon NV

Lotnummer/N° du Lot :
zie op de verpakking/Voir sur l'emballage

Labelversie 05/2019

© Copyright Bayer CropScience

BE85348671C

Numéro d'autorisation: 10634P/B
Numéro d'agrément Luxembourgeois: L02243-017
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
à base de 4.5% d'idosulfuron-méthyl-sodium, 4.5% de mesosulfuron-méthyl, 3.75% de thiencarbazone-méthyl et 13.5% de méfenpyr-diéthyl (safener).

GHS07



GHS09



**Waarschuwing
Attention
Achtung**



Toelatingshouder/Détenteur d'autorisation :
Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
Tel. 02/535 63 11
www.cropscience.bayer.be

Bayer