



FENOMENAL

6 kg

Toelatingsnummer/
N° d'autorisation: 9500P/B**Systemisch fungicide** voor aardbeien, druiven, witlof, slasoorten, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood, veldsla, peterselse, en sierplanten.

Waterdispergeerbaar granulaat (wg) op basis van 60% fosetyl en 6% fenamidone.

Fongicide systémique pour fraisiers, vignes, witlof, laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre, mache, persil et plantes ornementales.

Granulés à disperser dans l'eau (wg) à base de 60% de foséthyl et 6% de fénamidone.

GEBRUIK EN GEBRUKSDOSSIEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik. De gewasgroepen in de tabel hieronder geven structuur aan het etiket. Elk specifiek vermelde gewas kunnen onder de kolom "teelt" zijn toegelaten. De gebruiksvoorwaarden moeten per gewas geraadpleegd worden.

A. BEWERSCHUTEN EN KLEIN FRUIT

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdsp
Aardbeien (productieveid, selectie- en vermeerde- ringssveld) (open lucht)	<i>Phytopthora</i> <i>cactorum</i> (sterigebasist) en <i>Phytopthora</i> <i>fragariae</i> (rood wortelrot)	Vóór het uitplanten: onderdoppen: gedurende 15 minuten in een oplossing van 150 g per 100L water. Of na het uitplanten: 100 milplant aangieten van een oplossing van 75 g per 100L water.	Bij het uitplanten van zomaarplantingen: 1 toepassing.
		Aangieten: 100 ml per plant van een oplossing van 75 g/100L water. Of bladbeschutting: 4,5 kg/ ha met minstens 2000L water/ha.	Bij het heremien van de groei in de lente voordat de planten voor lenteplantingen. 1 toepassing.
			Toepassingsvoorwaarden: Maximum 2 toepassingen per 12 maanden, waarin maximum 1 door bespuiting. Het doppenlast kan slechts één dag worden gebruikt, waarbij voorzien moet worden dat het doppenlast teveel verouderd is. Het doppenlast indien nodig evenlaten met een oplossing van de normale concentratie (15 g/100L water). De wortels niet laten udrogen na het doppenlast. De dosis voor het aangieten komt overeen met 75g Fenomenal/1000 planten of 4000 planten/ha. Riscobeperkende maatregelen: Bij bladbeschutting: een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. Bij aangieten: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Aardbeien (productieveid, selectie- en vermeerde- ringssveld) (onder bescherming)			
	<i>Phytopthora</i> <i>cactorum</i> (sterigebasist) en <i>Phytopthora</i> <i>fragariae</i> (rood wortelrot)	Aangieten: 100 ml per plant van een oplossing van 75 g/100L water. Of bladbeschutting: 4,5 kg/ ha met minstens 2000L water/ha.	Bij het heremien van de groei in de lente voordat de planten voor lenteplantingen. 1 toepassing.
			Toepassingsvoorwaarden: Maximum 2 toepassingen per 12 maanden, waarin maximum 1 door bespuiting. De dosis voor het aangieten komt overeen met 75 g Fenomenal/1000 planten of 3 kg Fenomenal/ha (gebaseerd op 4000 planten/ha).

Druivelaars (tafeldruiven en voor wijn- productie) (open lucht)	valse meeldauw (<i>Plasmopara viticola</i>)	1,2 kg/ha haag	
			Toepassingsvoorwaarden: 1-3 toepassingen. Riscobeperkende maatregelen: een bufferzone van 20 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. Voldoende sterfijn voor de oogst: 35 dagen.

B. BLADGROENTEN

Slaarten, andijvie, radi- chieso, rosso, suikerbrood en veldsla (open lucht en onder bescherming)	valse meeldauw (<i>Peronospora</i> <i>varianterae</i>)	2,5 kg/ha	Vanaf 7 dagen na het planten tot 20 % van het riet knippelvolume (BBCH 42). Preventief toepassen, ten laatste vanaf het verschijnen van de eerste symptomen.
			Toepassingsvoorwaarden: 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen. Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Spinazie (open lucht)	valse meeldauw (wolt) (<i>Peronospora</i> <i>fuscata</i>)	2,5 kg/ha	7 dagen na zaaien of snijden
			Toepassingsvoorwaarden: 1-2 toepassingen. Veiligheidstermijn voor de oogst: 21 dagen. Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Peterselse (consumptie en/of stengels) (open lucht en onder bescherming)	valse meeldauw (<i>Peronospora</i> <i>spp.</i>)	2 kg/ha	7 dagen na planten of na snijden. 1-2 toepassingen
			Toepassingsvoorwaarden: Max. 6 toepassingen / ha / 12 maanden. Om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige wortel te behandelen. Veiligheidstermijn voor de oogst: 21 dagen. Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Witloofwortels (bewaring)	valse meeldauw (<i>Peronospora</i> <i>spp.</i>)	2 kg/ha	Net voor de bewaring van witloofwortels.
			Toepassingsvoorwaarden: Max. 6 toepassingen / ha / 12 maanden. Om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige wortel te behandelen. Veiligheidstermijn voor de oogst: 21 dagen. Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Witlof en roodlof (forse hydrocultuur)	<i>Phytopthora</i> <i>cryptogea</i> / <i>P. erythrositica</i>	10 g/100L wateroplossing	Bij het begin van de forse (hydrocultuur).
			Toepassingsvoorwaarden: Maximum 1 toepassing. Veiligheidstermijn voor de oogst: 18 dagen.

Witlof en roodlof (forse grondcultuur)	<i>Phytopthora</i> <i>cryptogea</i> / <i>P. erythrositica</i>	3 g / 3 l water / m²	Toepassen over de wortelkragen, onmiddellijk na het intafelen
			Toepassingsvoorwaarden: Maximum 1 toepassing / 12 maanden. Veiligheidstermijn voor de oogst: 18 dagen.

C. SIERPLANTEN

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie (open lucht en onder bescherming))	wortelphytopthora (<i>Phytopthora</i> <i>cinnamomi</i>)	in houtachtigen: 75 g/100L water met 100 mL substraat.	10% van het volwassene aangieten of meerdruppelen variëert van deelbare modellen tot een aantal minimaal indien nodig. 10% van het volwassene aangieten of meerdruppelen variëert van deelbare modellen tot een aantal minimaal indien nodig.
		in niet-houtachtigen: 150 g/100L water met 100 mL substraat.	
		in grondloze teelt(en): 75 g/100L water/1500 planten.	

Kiemkramms (<i>Pythium</i> spp.)	Aangieten of meerdruppelen gevuld door inregeling: 75 g/100L water/1500 planten.	1 toepassing voor het planten van de bollen.	verspreiden en mengen met het potgrond met 100 g/20L water/m³ potgrond.
			Toepassingsvoorwaarden: Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een minimale bufferzone van 3 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Algemene opmerking betreffende de dosis: De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijheid van de gebruiker, bij vergeling van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

GEbruiken CONFORM ARTIKEL 51 EG 1107/2009 - Het gebruik van Fenomenal in de teelten vermeld in onderstaande tabel is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefuitstelling uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijheid van de gebruiker.

BLADGROENTEN EN KRUIDEN

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdsp
Rode amaro, bieslook, dille, snijleider, koriander, lavas, maggiplantaat, salie, rozemarijn, marjolein, oregano, tijm, basilicum, citroenmelisse, munt, laurier, dragon (consumptie bladeren en/of stengels), gewone bermoechte (consumptie van de bloemen), tulinkers en andere kleine en schoten (open lucht en onder bescherming)	valse meeldauw (<i>Peronospora</i> spp., <i>P. parasitica</i>)	2,5 kg/ha	7 dagen na zaaien/planten of na snijden.
	Toepassingsvoorwaarden: 1-2 toepassingen. Om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige wortel te behandelen. Veiligheidstermijn voor de oogst: 21 dagen. Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		

Babyleaf (gegotst tot het stadium 8 bladeren) (open lucht en onder bescherming)	valse meeldauw (<i>Peronospora</i> spp.)	2,5 kg/ha	7 dagen na zaaien/planten of na snijden.
			Toepassingsvoorwaarden: 1-2 toepassingen. Om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige wortel te behandelen. Veiligheidstermijn voor de oogst: 21 dagen. Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Rucola (open lucht en onder bescherming)	valse meeldauw (<i>Peronospora</i> spp.)	2,5 kg / ha	na planten of na snijden
			Toepassingsvoorwaarden: Maximal 3 toepassingen per teelt met een interval van 7 dagen. Om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige wortel te behandelen. Veiligheidstermijn voor de oogst: 21 dagen. Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht en onder bescherming)	valse meeldauw (<i>Peronospora</i> spp.)	2 kg/ha	7 dagen na zaaien/planten of na snijden; 1-2 toepassingen
			Toepassingsvoorwaarden: Max. 6 toepassingen / ha / 12 maanden. Om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige wortel te behandelen. Veiligheidstermijn voor de oogst: 21 dagen. Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht en onder bescherming)	blad- en takphytopthora en valse meeldauw (<i>Pythium</i> spp. en <i>Peronospora</i> spp.)	250 g/100 L	
	Toepassingsvoorwaarden: 1- 3 toepassingen. Riscobeperkende maatregelen (open lucht): een bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. Hoge grond wordt toegestaan tussen de te behandelen teelt en de vaste planten.		

H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.	Provoque une sévère irritation des yeux.	Verursacht schwere Augenreizung.
H410	Zeer giftig voor het waterlevende organismen, met langdurige gevolgen.	Très毒對水生生物，具有長期的影響。	Sehr giftig für Wasseronorganismen mit langfristiger Wirkung.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.	Tenir hors de portée des enfants.	Der darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.	Ne pas manger, boire ou fumer pendant ce produit.	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P273	Voorkomen dat de lucht vervuild wordt.	Éviter que l'air soit pollué.	Freisetzung in die Umgebung verhindern.
P280	Oogbescherming drogen.	Recueillir le déversement.	Augenschutz trocken.
P391 + P338	Gedroogde resten verwijderen.	Retirer les débris.	Reste entfernen.
P391	Gebruik een goed afgeruimde omgeving.	Utiliser une bonne surface de travail.	Arbeitsfläche mit einem guten Arbeitsplatz einrichten.
P305 + P340	Om gewasbeschadiging te voorkomen, eerst de oogbescherming te verwijderen.	Avant de traiter les yeux, retirer tout masque ou lunettes de protection.	Arbeitskleidung mit einem guten Arbeitsplatz einrichten.
P305	Om gewasbeschadiging te voorkomen, eerst de oogbescherming te verwijderen.	Avant de traiter les yeux, retirer tout masque ou lunettes de protection.	Arbeitskleidung mit einem guten Arbeitsplatz einrichten.
P338	Om gewasbeschadiging te voorkomen, eerst de oogbescherming te verwijderen.	Avant de traiter les yeux, retirer tout masque ou lunettes de protection.	Arbeitskleidung mit einem guten Arbeitsplatz einrichten.
P337	Om gewasbeschadiging te voorkomen, eerst de oogbescherming te verwijderen.	Avant de traiter les yeux, retirer tout masque ou lunettes de protection.	Arbeitskleidung mit einem guten Arbeitsplatz einrichten.
P337 + P313	Om gewasbeschadiging te voorkomen, eerst de oogbescherming te verwijderen.	Avant de traiter les yeux, retirer tout masque ou lunettes de protection.	Arbeitskleidung mit einem guten Arbeitsplatz einrichten.
P501	Inhoud en gebruik gezondheidsgrens overschrijden.	Exposer à une dose dépassant les limites de sécurité.	Inhalation/Verwendung über die gesundheitliche Grenze hinaus.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid te verminderen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsleitung einhalten.
	</		