AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP Symptomen: geen gegevens beschikbaar bij de mens, de | Eerste hulp maatregelen vermelde symptomen zijn afgeleid uit dierexperimenten. Inademen: Geen symptoom waargenomen in dierstudies. Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking de terre est entièrement traitée. likken: Geen symptoom waargenomen in dierstudies. | Inslikken: Spoel de mond. Bel het antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts n toon het etiket of de verpakking. Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn. raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking Opmerkingen voor de arts spitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Voor bijkomende inlichtingen, contacte Het Antigifcentrum 070/245.245

abricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke • SP1 : ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de eit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan. en wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft ele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien k bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wiiten is aan een gebrek van het product. De koper Iraagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

Use only for corrections

▼ print-pdf (for server upload) |

USAGE ET DOSE D'EMPLOI

Le Monceren® FS 250 peut être appliqué de deux facons différentes:

1) Application avant la plantation

L'application a lieu dans un espace clos. A l'aide de buses de pulvérisation, les plants de pommes de terre sont traités avec le produit, durant le transport sur la bande de transport/la table à rouleaux. De cette facon, la surface des pommes

L'application a lieu sur le champ, simultanément avec la plantation des pommes de terre. Pour ce faire, la pla être équipée d'un système grâce auguel l'application est réalisée à l'intérieur de la planteuse, dans un systèn cette fácon, le produit est appliqué directement sur les plants de pommes de terre pendant la plantation, just

ture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
nts de pommes de e (désinfection)	Le rhizoctone brun (Rhizoctonia solani)	0,6 L/1000 kg plants de pommes de terre	BBCH 00 - 03; traitement de tubercules avant/pendant la plantation
	Conditions d'application : Max. 1 application.	et indemnes de terre	

CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION

Produit destiné à un usage professionnel.

• Ne pas utiliser les plants traités pour la consommation, humaine ou animale, et ce même en mélange avec des tubercules non traités.

points de ramassage prévus à cet effet. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer,

c de l'eau à proximité de terrains revêtus reliés à des eaux de surface (caniveaux, avaloirs....). Si nécessaire, le

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

l'étiquette ou l'emballage.

SPo2 - Laver tous les équipements de protection après utilisation.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

lanteuse doit eme clos. De ste avant qu'ils	Peu de d été obse
	Inhalati animaux
ation	

Veiller à une bonne aération du local de désinfection.

Nettoyer avec un linge humide les surfaces souillées avec du Monceren® FS 250.

TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Vider soigneusement et complètement l'emballage. L'emballage ainsi vidé devra être ramené par l'utilisateur aux

en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes. r le traitement avant plantation: éviter de relâcher le produit dans les eaux d'égouttage, ne pas nettoyer le matériel

oduit en excédent et l'eau de nettoyage peuvent être pulvérisés sur les plants de pommes de terre qui sont situés sur

• Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri

	nées disponibles chez l'homme. Les symptômes d s sur des animaux.
Inhalation animaux.	: Aucun symptôme observé dans les études sur
Ingestion :	Aucun symptôme observé dans les études sur an

Inhalation: Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

nimaux. Ingestion: Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension de l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer

k : Non irritant.

Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau ou pro une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de sympt consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage

Projection dans les veux : Rincer abondamment à l'eau penda 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Por

de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de cont puis rincer. Consulter un médecin.

ur le médecin Prise en charge: traitement symptomatique

Contacter le Centre antipoison pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du décât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités



cide voor het ontsmetten van aard lakschurft (Rhizoctonia solani) f tijdens het planten.

cide pour la désinfection des pl nmes de terre contre le tone (Rhizoctonia solani).



P102 Tenir hors de portée des enfants.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P273 Éviter le reiet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection.

P391 Recueillir le produit répandu.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauc

P501 Inhalt/Behälter einem Sammelpunkt

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

H411 Giftig voor in het water levende organismen.

met langdurige gevolgen.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 Niet eten, drinken of roken tiidens het aebruik

P273 Voorkom lozing in bet

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimer

P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou

Information supplémentaire

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelf

P280 Schutzhandschuhe

P391 Verschüttete Mengen aufnehme

zie binnenkant / voir à l'intérieur

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSIS

Monceren® FS 250 kan op 2 verschillende manieren toegepast worden:

) Behandeling vóór het planten

De toepassing vindt plaats in een gesloten ruimte. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een transportband (rollentafel), waarbij het product tijdens het transport over de band met behulp van spuitdoppen over het pootgoed gespoten wordt. Op deze manier wordt het volledige oppervlak van de aardappelen behandeld.

De toepassing vindt plaats op het veld, in combinatie met het planten van de aardappelen. Hiervoor moet de pootmachine uitgerust zijn r een systeem waarbij de toepassing uitgevoerd kan worden binnenin de pootmachine, in een gesloten systeem. Zo wordt het product tijdens het planten direct aangebracht op de pootgoedknollen, waarna deze in de plantvoor terecht komen en onmiddellijk met grond bedekt worden.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Aardappel-	Lakschurft (Rhizoctonia solani) 0	0,6 L/1000 kg pootgoed	BBCH 00-03; knolbehandeling voor/tijdens het poten
pootgoed (ontsmetting)	Toepassingsvoorwaarden:		
(3,	Max. 1 toepassing.		
	Pootgoed moet droog en vrij van aar	ırde zijn.	

Product bestemd voor beroepsgebruik.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORV

Behandeld pootgoed niet voor consumptiedoeleinden gebruiken, ook niet aan dieren voederen, zelfs niet na menging met onbehandelde

Zorg voor een goede verluchting van het ontsmettingslokaal.

Oppervlakken die met Monceren® FS 250 bestoven zijn, met een vochtige doek reinige

BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSC De verpakking van dit product zorgvuldig en volledig ledigen. De aldus geledigde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden

op een daartoe voorzien inzamelpunt. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor een ander doel. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.
- Bij de behandeling vóór het planten: vermijd het vrijkomen van product in rioolwater, reinig geen werkmateriaal met water in de nabijheid van verharde oppervlakten verbonden met oppervlaktewater (afvoer, sloot, goot,...). Indien nodig kan het productoverschot en het reinigingswater op het aardappelpootgoed, gelegen op biofilters of op naakte grond, gespoten worden.

VOORZORGSMAATREGELEN

Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.

Dit product in een griginele gesloten verpakking vorstyrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd, SPo2 – was alle beschermende kleding na gebruik.

op basis van 250 g/L pencycuron. Numéro d'autorisation : 10342P/B

Suspension concentrée pour traitement de semences (FS), à base de 250 g/L de pencycuron.

Monceren®FS 250 - Trademark of Bayer Group

C Copyright Bayer CropScience

Labelyersie 07/2016

Toelatingsnummer: 10342P/B

Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling (FS).



Lotnummer/N° du Lot : zie op de verpakking/Voir sur l'emballage.

PMR: 81686831C Size: 1138x150,5 mm

Plan: 9824C Date: 20.9.16

Color: CMYK + Kontur