

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSSIEN

Ter bestrijding van aaltjes (nematoden) en bepaalde bodemschimmels (*Phoma*, *Fusarium*, *Pythium*, *Verticillium*, *Sclerotinia*, *Botrytis*, *Alternaria*, ...). Metam-natrium werkt bovendien secundair tegen kiemschaden en aaltjes (nematoden): 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie. Lees aandachtig het etiket voor gebruik. De gewasgroepen hieronder geven structuur aan het etiket. Enkel de specifieke vermelde gewassen onder 'teelt' zijn toegelaten. De gebruiksvoorwaarden moeten per gewas geraadpleegd worden.

PITVRUCHTEN: Teelt: appelbomen & perenbomen

- o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden): 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.
- o Toepassingstidstp: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
- o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

STEENVRUCHTEN: Teelt: kersen- en kriebonbomen & pruimenbomen (open lucht)
o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden): 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.

- o Toepassingstidstp: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
- o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT: Teelt: aalbessen (witte, rode, zwarte), blauwe / rode bosbessen, veenebessen, stekelbessen (kruisbes) en kruisingen, druivelars (tafeldruiven), frambozenstruiken en braamstruiken (open lucht en onder bescherming)
o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden):

- *In open lucht*: 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.
- *Onder bescherming*: 1 toepassing aan 5 - 7,5 L / are door druppelirrigatie.

- o Toepassingstidstp:
 - *In open lucht*: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september
 - *Onder bescherming*: 3 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
- o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

Teelt: druivelars (voor wijnproductie) & aardbeien (productieveld, selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)

- o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden): 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.
- o Toepassingstidstp: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
- o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

WORTEL- EN KNOLGEWASSEN:

Teelt: aardappelen, aardappelpootgoedteelt, wortelen, knolselder, schorse-neren, pastinaak, rammenas en rettich, raap (stoppellaap, meiraap) (open lucht)

- Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden): 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.
- Toepassingstidstp: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
- Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

Teelt: radijs (open lucht en onder bescherming)

- o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden):
- *In open lucht*: 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.
- *Onder bescherming*: 1 toepassing aan 5 - 7,5 L / are door druppelirrigatie.

- o Toepassingstidstp:
 - *In open lucht*: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
 - *Onder bescherming*: 3 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
- o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

VRUCHTGRONENTEN: Teelt: tomaten, paprika / spaanse pepper, aubergine / eierplant en pepino, komkomm, augurk, courgette/patisson, meloen & pompoen (onder bescherming)

- o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden): 1 toepassing aan 5 - 7,5 L / are door druppelirrigatie.
- o Toepassingstidstp: 3 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
- o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

BLADGRONENTEN, KRUIDEN EN EETBARE BLOEMEN: Teelt: veldsla, sla soorten, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood, rucola, spinazie, warmoes (snijbiet), peterselie (consumptie bladeren), **bieslook** (consumptie bladeren), **kervel** (consumptie bladeren), **dille** (consumptie bladeren), **engelwortel** (consumptie bladeren), **snijselder** (consumptie bladeren), **karwij** (consumptie bladeren), **koriander** (consumptie bladeren), **lavas / maggiplant** (consumptie bladeren), **roomse kervel** (consumptie bladeren), **dragon** (consumptie bladeren), **hysop** (consumptie bladeren), **citroenmelisse** (consumptie bladeren), **munt** (consumptie bladeren), **basilicum** (consumptie bladeren), **marjolein/oregano** (consumptie bladeren), **rozemarijn** (consumptie bladeren), **salie** (consumptie bladeren), **bonenkruid** (consumptie bladeren), **tijm** (consumptie bladeren), **laurier** (consumptie bladeren), **postelein** (consumptie bladeren), **zuring** (consumptie bladeren), **zeekraal** (consumptie bladeren en/of stengels) & **gewone bernagie** (consumptie van de bloemen) (open lucht en onder bescherming)

- o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden):
 - *In open lucht*: 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.
 - *Onder bescherming*: 1 toepassing aan 5 - 7,5 L / are door druppelirrigatie.
- o Toepassingstidstp:
 - *In open lucht*: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
 - *Onder bescherming*: 3 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.

o Voor de behandeling van rucola en fijne kruiden: om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

Teelt: wilfoof/wortelteelt, wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) & **valeriaan** (consumptie wortels) (open lucht)

- o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden): 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.
- o Toepassingstidstp: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.

- o Voor de behandeling van wortelpeterselie, wortelkervel en valeriaan: om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
- o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

- BIETEN: Teelt: suikerbieten & voederbieten** (open lucht)
 - o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoden): 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.
 - o Toepassingstidstp: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
 - o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

SIEERPLANTEN

- Teelt: sierplanten** (niet bestemd voor consumptie) (Open lucht en Onder bescherming):
 - o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoeden):
 - *In open lucht*: 1 toepassing aan 3 L / are door bodeminjectie of druppelirrigatie.
 - *Onder bescherming*: 1 toepassing aan 5 - 7,5 L / are door druppelirrigatie.
 - o Toepassingstidstp:
 - *In open lucht*: 6 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
 - *Onder bescherming*: 3 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.
 - o Risicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

POTGROND (teelaarde) (alle gewassen):
o Ter bestrijding van bodemschimmels en aaltjes (nematoeden): 1 toepassing aan 5 - 7,5 L / are door druppelirrigatie.

- o Toepassingstidstp: 3 weken voor het zaaien / planten; van 1 april tot en met 30 september.

o RIsicobeperkende maatregelen: zie hieronder.

RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN:

- Voor toepassingen in open lucht:**
 - o *Ter bescherming van in het water levende organismen*: bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.
 - o *Ter bescherming van omwonenden, voorbijgangers en arbeiders*:
 - Bij toepassing door bodeminjectie:
 - o Behandelde oppervlakte ≤ 3 ha: bufferzone van 20 m respecteren ten opzichte van woningen en werkplaatsen.
 - o Behandelde oppervlakte > 3 ha EN ≤ 5 ha (max): bufferzone van 30 m respecteren ten opzichte van woningen en werkplaatsen.
 - Bij toepassing door druppelirrigatie en behandelde oppervlakte ≤ 6400 m² (max): bufferzone van 30 m respecteren ten opzichte van woningen en werkplaatsen.
 - **Voor toepassingen onder bescherming**: Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m².
 - *Ter bescherming van omwonenden, voorbijgangers en arbeiders*: bufferzone van 30 m respecteren ten opzichte van woningen en werkplaatsen.

Algemene opmerkingen / aanbevelingen:

- De hoge dosis gebruiken in zware en humusrijke gronden en ter bestrijding van bodemschimmels.
- SPe1: om de grondorganismen te beschermen, mogen producten die de metaboliet MITC genereren, dus producten die metam-natrium of metam-kalium of dazomet bevatten, slechts eenmaal per 3 jaar op hetzelfde perceel worden toegepast.
- Uiterste gebruikstidstp voor de oogst: bepaald door het toepassingstidstp.
- Tot 14 dagen na toepassing van het product moet een sperzone van 5 meter rond de behandelde oppervlakte of de behandelde serre gerespecteerd worden: het is verboden om de sperzone te betreden en waarschuwingsborden moeten worden geplaatst.
- Om de omwonenden, de voorbijgangers en de arbeiders te beschermen, moet een bufferzone ten opzichte van de woningen en de werkplaatsen gerespecteerd worden. Voor instructies bij een specifieke teelt, zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdossissen.'
- Het product bezit aan de erkende dosis een secundaire werking als herbicide.
- Om mogelijke hinder voor de teopassen en omwonenden te vermijden, wordt het product bij voorkeur toegepast door bodeminjectie. Indien men teopast via de druppelirrigatieslar-men wordt de toegede hoeveelheid product toegepast als een constante verduinning.
- Niet teopassen bij bodemtemperaturen lager dan 10°C en hoger dan 20°C. De toepassing moet plaatsgripen in een bewerkte, fijn kruimelige bodem die vrij is van onverteerbare plantenresten en op ochtige grond.
- Om een goede werkzaamheid te waarborgen en gevaar voor de menselijke gezondheid te voorkomen, is een voldoende bodemvochtigheid vereist, variërend van 50 tot 75% van de veldcapaciteit van de bodem.
- Zowel bij toepassing via bodeminjectie als bij toepassing via het druppelirrigatiesysteem moet de bodem worden afgedekt met gasdichte folie (TIF (Totally Impermeable Film)). Voor toepassingen in open lucht moet de bodem tot 42 dagen na de toepassing worden afgedekt en voor toepassingen onder bescherming moet de bodem tot 14 dagen na de toepassing worden afgedekt.
- Bij toepassing in kassen, vrij van planten en dieren, moeten deze goed afsluitbaar zijn.
- Naast de opslagvoorwaarden voorzien in art.27§§1 en 2 van het KB duurzaam gebruik van 19/03/2013, zijn volgende aanvullende voorwaarden van toepassing: Dit middel moet opgeslagen worden in een lokaal dat zich bevindt de gebouwen bevindt waar ook mensen of dieren verblijven. Dit betekent dat het lokaal niet gelegen is in een woongebouw, stal of bewerkingsruimte. Het lokaal moet goed geventileerd worden. Er mag geen gasuitwisseling mogelijk zijn (geen ventilatiebuizen of roosters, geen deuren) tussen het opslaglokaal en een eventueel aangrenzend gebouw waar mensen of dieren verblijven. Dak- en wandmaterialen moeten voorkomen dat de opgeslagen producten opgewarmd kunnen raken. De temperatuur mag niet hoger zijn dan 30°C,

en niet lager dan 0°C. De verpakkingen van vaste en vloeibare producten moeten in opvangbakken geplaatst worden. Gasflessen moeten rechtop bevestigd worden.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt ge waarborgd in de meeste gewassen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik. • Het product mag uitsluitend worden toegepast door houders van een fytoicentie "Specifiek professioneel gebruik voor metam-natrium".
- De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste Hulp Maatregelen:
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INSLIKKEN:
De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Draag, zo mogelijk, beschermende handschoenen bij het toedienen van eerste zorgen. Vermijd rechtstreeks contact met besmette kledij, schoenen en braaksel. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.
NA INADEMEN:
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Indien de kleding aan de huid kleeft: eerst de kleding en huid met veel water afspoelen en pas daarna uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Draag zo mogelijk beschermende handschoenen bij het toedienen van eerste zorgen. Vermijd contact met besmette kleding en schoenen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde werkkleding mag de werkkruite niet verlaten.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Methylisothiocyanaat (MITC) wordt gevormd bij contact met water/zuren.
De veiligheid van de hulpverleners moet verzekerd worden. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het **Antigifcentrum 070/245.245.**

Voor **"Bereiding van de spuitoplossing, behandeling van de lege verpakking en behandelingsoverschotten"**, zie boekje.

Voor **"Maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater"**, zie boekje.

Voor **"Voorzorgsmaatregelen"**, zie boekje.

Voor **"Waarborg"**, zie boekje.

USAGES ET DOSES D’EMPLOI

Pour combattre les nématodes (*Nematoda*) et certains cryptogames du sol tels que *Phoma*, *Fusarium*, *Pythium*, *Verticillium*, *Sclerotinia*, *Botrytis*, *Alternaria*,... Le métam-sodium a en outre un effet secondaire contre les mauvaises herbes en voie de germination. Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit: Ci-dessous, les plantes cultivées ont été regroupées afin de structurer l'étiquette. Seules les cultures mentionnées dans 'culture' sont autorisées. Les conditions d'utilisation doivent être consultées pour chaque culture.

- FRUITS À PÉPINS: Culture: pommiers et poiriers** (en plein air)
 - o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
 - o Stade d'application: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
 - o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

- FRUITS À NOYAU: Culture: cerisiers, griottiers & pruniers** (en plein air)
 - o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
 - o Stade d'application: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
 - o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

BAIES ET PETITS FRUITS: Culture: groseilliers (blancs/ rouges/ cassis), myrtilles / aïrelles rouges, aïrelles canneberges, groseilliers à maquereau et hybrides, vignes (raisins de table), framboisiers et ronces (mûres) (en plein air et sous protection)

- o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes:
 - *En plein air*: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
 - *Sous protection*: 1 application à 5 - 7,5 L / are par irrigation goutte à goutte.
- o Stade d'application:
 - *En plein air*: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
 - *Sous protection*: 3 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
- o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

- Culture: vignes** (pour production de vin) & **fraissiers (champ de production, de sélection et de multiplication)** (en plein air)
 - o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
 - o Stade d'application: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
 - o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.
- Culture: vignes** (pour production de vin) & **fraissiers (champ de production, de sélection et de multiplication)** (en plein air)
 - o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
 - o Stade d'application: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
 - o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.
- TERREAUX (substrats de cultures) (toutes cultures):**
 - o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes: 1 application à 5 - 7,5 L / are par irrigation goutte à goutte.
 - o Stade d'application: 3 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
 - o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.
- MESURES DE REDUCTION DU RISQUE:**
 - **Pour les applications en plein air:**
 - o *Pour protéger les organismes aquatiques*: respecter une zone tampon de 10 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.
 - o *Pour protéger les riviérains, les passants et les travailleurs*:

3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.

- o Stade d'application: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.

- o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

- Culture: radis** (en plein air et sous protection)
 - o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes:
 - *En plein air*: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
 - *Sous protection*: 1 application à 5 - 7,5 L / are par irrigation goutte à goutte.
 - o Stade d'application: - *En plein air*: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus. - *Sous protection*: 3 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
 - o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

LÉGUMES-FRUITES: Culture: tomates, poivrons/piment, aubergine & pépinois, concombre, comichon, courgette / pâtisson, melon & potiron (sous protection)

- o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes: 1 application à 5 - 7,5 L / are par irrigation goutte à goutte.
- o Stade d'application: 3 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
- o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

LÉGUMES-FEUILLES, FINES HERBES ET FLEURS COMESTIBLES: Culture: Mâche, laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre, roquette, épinard, bette (blette), persil (consommation des feuilles), **ciboulette** (consommation des feuilles), **cerfeuil** (consommation des feuilles), **aneth** (consommation des feuilles), **angélique** (consommation des feuilles), **céleri à couper** (consommation des feuilles), **carvi** (consommation des feuilles), **coriandre** (consommation des feuilles), **livèche** (consommation des feuilles), **cerfeuil musqué** (consommation des feuilles), **estragon** (consommation des feuilles), **hysope** (consommation des feuilles), **meïsse** (consommation des feuilles), **menthe** (consommation des feuilles), **basilic** (consommation des feuilles), **marjolaine/origan** (consommation des feuilles), **romarin** (consommation des feuilles), **sauge officinale** (consommation des feuilles), **sariette des jardins** (consommation des feuilles), **thym** (consommation des feuilles), **laurier** (consommation des feuilles), **pourpier** (consommation des feuilles), **oseille** (consommation des feuilles), **salicorne** (consommation des feuilles et/ou tiges) & **bourrache commune** (consommation des fleurs) (en plein air & sous protection)

- o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes:
 - *En plein air*: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
 - *Sous protection*: 1 application à 5 - 7,5 L / are par irrigation goutte à goutte.
- o Stade d'application:
 - *En plein air*: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
 - *Sous protection*: 3 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
- o Pour le traitement de la roquette et des fines herbes: pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.
- o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

Culture: culture de racines de wilfoof, persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (consommation des racines) & **valériane officinale** (consommation des racines) (en plein air)

- o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
- o Stade d'application: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
- o *Pour le traitement du persil à grosses racines, du cerfeuil tubéreux et de la valériane officinale: pour* prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.
- o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

BETTERAVES: Culture: betteraves sucrières & betteraves fourragères (en plein air)


- o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
- o Stade d'application: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
- o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

PLANTES ORNEMENTALES: Culture: plantes ornementales (non destinées à la consommation) (en plein air et sous protection):

- o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes:
 - *En plein air*: 1 application à 3 L / are par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte.
 - *Sous protection*: 1 application à 5 - 7,5 L / are par irrigation goutte à goutte.
- o Stade d'application:
 - *En plein air*: 6 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
 - *Sous protection*: 3 semaines avant semis/plantation; du 1er avril au 30 septembre inclus.
- o Mesures de réduction du risque: voir ci-dessous.

LÉGUMES-RACINES ET POMMES DE TERRE, carottes, céleri-raves, scorsonère, panais, radis noir et radis rave & navet (en plein air)

o Pour lutter contre des cryptogames du sol et nématodes: 1 application à



AANVULLENDE INFORMATIE EUH031 - Vormt giftig gas in contact met zuren. EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
--

MENTIONS DE DANGER H290 - Peut être corrosif pour les métaux. H302 - Nocif en cas d’ingestion. H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H332 - Nocif par inhalation. H351 - Susceptible de provoquer le cancer. H361d - Susceptible de nuire au fœtus. H373 - Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE P260 - Ne pas respirer les aérosols. P263 - Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l’allaitement. P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P391 - Recueillir le produit répandu. P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. P304+P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308 +P311 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES EUH031 - Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

GEFAHRENHINWEISE H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE P260 - Aerosol nicht einatmen. P263 - Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden. P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. P301+P330+P331 - BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P304+P340 - BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P308+P311 - BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN EUH031 - Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Pour **"Préparation de la bouillie, traitement des emballages vides et surplus de traitement"**, voir livret. Pour **"Mesures pour éviter la pollution des eaux souterraines et de surface"**, voir livret. Pour **"Mesures de précaution"**, voir livret. Pour **"Garantie"**, voir livret.

- Si application par injection dans le sol:

- o Surface traitée ≤ 3 ha: respecter une zone tampon de 20 m par rapport aux habitations et aux zones de travail.
- o Surface traitée > 3 ha et ≤ 5 ha (max): respecter une

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen. De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvoestof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.

SPe2: Om de waterorganismen te beschermen, mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan. SPe3: om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een welbepaalde bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosissen'.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

VOORZORGSMATREGELEN

Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn. Dit product in een originele gesloten verpakking bewaren in een fris en droog lokaal beschermd tegen de vorst. SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik. Na het gebruik of manipulatie van de vaten, onmiddellijk de handen wassen.

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

PREPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Remplir la cuve à ½ d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter

le volume de la cuve. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

SP1: ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.

SPe2: afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme «sterk erosiegevoelig». Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en oeuvre.

SPe3: pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'. En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

MESURES DE PRECAUTION

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, dans un local frais et sec, à l'abri du gel. SPo2: Laver tous les équipements de protection après utilisation. Se laver les mains immédiatement après manipulation ou usage.

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur: nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Surf naar www.cropscience.bayer.be
en klik voor de perfecte beschermingskledij

Surfez sur www.cropscience.bayer.be
et cliquez pour trouver le vêtement de
protection le mieux adapté




Toelatingshouder /
Défendeur de l'autorisation:
TAMINCO B.V.B.A.
Panterschipstraat 207
B-9000 Gent

Emergency only: NCEC +44 1235 239670

UN 3267

Gevaar
Danger
Gefahr

GHS05




GHS07



GHS08



GHS09



8

WERKINGSWIJZE / MODE D'ACTION:

GROUP

8F

NEMATOCIDE / FUNGICIDE

Verdeler / Distributeur:

Bayer CropScience SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14 - 1831 Diegem (Machelen)

Tel. 02/535 63 11 - www.cropscience.bayer.be

