



Bevat maleïne hydrazide

- in het aardappelgewas systemisch neerwaarts transport en verdeling in de knol
- stopt de celdeling, maar celgroei en celstrekking gaan wel gewoon door
- remt de kieming

Fazor® voor betere kwaliteit

- De beste basis van kiemremming
- geen schilbrand
- minder gewichtsverlies tijdens bewaring
- tegen interne kieming
- tegen doorwas
- tegen aardappelopslag in volgteelt

Toepassingstijdstip:

- Minimaal 80% van de knollen moet groter dan 35mm zijn voor industriërassen
- Sduit op een niet gestresseerd, vitaal en goed groeiend gewas
- Periode tot loofdoding moet minimaal 3 weken, bij voorkeur 4-5 weken zijn

Advies en spuitomstandigheden:

- 5 kg Fazor / ha
- 400 – 500 l water/ha
- Toepassen bij minder dan 25 °C
- Groeizaam weer en voldoende hoge relatieve luchtvochtigheid (> 60%)
- Droogtijd 24 uur

Geen schilbrand

Omdat Fazor® al tijdens de teelt wordt toegepast, krijgt schilbrand – welke kan optreden bij het toepassen van andere kiemremmers tijdens het inschuren – geen kans. Bovendien is er geen negatief effect op de wondheling.

Minder kans op interne kieming

Toepassing van Fazor® vermindert ook het risico op interne kieming. Met name voor gevoelige rassen zoals Innovator is dit een belangrijke eigenschap. Bovendien heeft Fazor® geen negatieve invloed op de bakkleur, het onderwatergewicht of op de smaak

Minder bewaarverliezen

Doordat je de eerste periode geen kiemremmer hoeft toe te passen, blijven de aardappelen rustiger, waardoor er minder ademhaling is en dus ook minder bewaarverlies.

Daarnaast is er een besparing op behandelingen met andere kiemremmers. Ook de presentatie (verser uitzicht) blijft beter dan bij andere bewaarmethoden.

Meer flexibiliteit en geen residu in de bewaarplaats

Doordat de kieming is geremd, zijn de aardappelen rustiger en kan je één loods over een langere oogstperiode vullen, zonder al andere kiemremmers te moeten toepassen op de eerst geoogste. Fazor® geeft geen residu in de bewaarplaats, waardoor daar bvb. pootgoed kan opgeslagen worden. Bij gebruik van de meeste andere kiemremmers kan dat niet.



Sterk tegen aardappelopslag

Toepassing van Fazor® leidt tot enorme vermindering van het aantal opslagplanten in het volggewas.

Aardappelopslag is niet alleen een onkruid in het volggewas, maar ook een belangrijke bron voor *Phytophthora infestans*, virus, uitbreiding van verschillende aaltjespopulaties en de Coloradokever.