



Schéma de pulvérisation pour des cerises 2023

Période	Maladie ou ravageur	Traitement	Remarques
gonflement des boutons	chancre bactérien (<i>Pseudomonas</i>) et formes hivernales de moniliose, phytophtes	25% Hydroxyde de cuivre 8 kg + Soufre	moyenne de max. 4 kg cuivre par ha et par an
bouton vert	pucerons	Teppeki 0,12 kg	min. 400 L d'eau/ha
floraison	moniliose des feuilles et maladies des tâches noires	Luna Experience 0,6 L	action curative lorsque T° > 12 °C
fin floraison (par périodes pluvieuses)	moniliose des feuilles, maladies des tâches noires	Tebusip 0,75 L	
directement après la floraison	pucerons	Teppeki 0,12 kg OU Pirimor 0,75 kg	appliquer Pirimor par temps chaud et calme, si feuilles enroulées Teppeki: intervalle de 21 jours entre 2 applications
directement après la floraison	tordeuses	Xentari 1 - 1,5 kg	
14 jours après la floraison	maladies criblée du cerisier (<i>Stigmina carpophila</i>)	Soufre	
coloration des fruits du vert vers le jaune	mouche de la cerise	Decis Trap Cerasi 100 pièges/ha	changement de coloration des premiers fruits
coloration des fruits du vert vers le jaune	mouche de la cerise, pucerons	Movento 2,25 L	
	<i>Drosophila suzukii</i>	Karate Zeon 0,135 L // Tracer 0,225 L // Exirel 0,87 L	max 2 applications par produit // alterner ces produits jusqu'à ce que la pression de la <i>Drosophila</i> soit terminée
7 jours avant la cueillette	<i>Botrytis</i> , moniliose du fruit	Teldor 1,5 kg // Switch 1 kg	Utiliser Teldor avec 300 L d'eau/ha et avec de fines gouttelettes pour éviter des résidus sur les fruits. Délai d'attente avant récolte de 3 jours. // Switch délai avant récolte de 4 jours
après la cueillette	anthracnose (<i>Coccomyces hiemalis</i>)	Syllit 544 Pro 1,25 L	répéter l'application après 10 jours

Faire les traitements en fonction des observations au champ

Dose par hectare de verger standard, plantation basse tige

N.B. : le produit Steward a été mentionné par erreur dans notre schéma Cerises 2023 (jusqu'à fin mars), alors que Steward n'est plus autorisé depuis le 2022.

DESHERBAGE

Période	Traitement		Remarques
	<u>Arbres nouvellement plantés / 1ère année</u>	<u>A partir de la deuxième année</u>	
avant saison	Stomp Aqua 3 L + Fusilade Max 1,5 L	Stomp Aqua 3 L	
après floraison		Diflanil 0,6 L	
été		Roundup 4 L (360 gr) of 3 L (480 gr)	si mauvaises herbes vivaces, alors rajouter des hormones- sur des arbres âgés d'au moins 3 ans

Les données mentionnées dans cette brochure couvrent autant que possible une saison culturale moyenne et reposent sur notre expérience pratique en matière d'essais ainsi que sur des observations réalisées chez les cultivateurs. Elles sont données à titre purement informatif. L'utilisateur doit toujours prendre connaissance des indications d'emploi en matière de produits phytosanitaires ainsi que des mesures de précaution telles que la législation le prévoit. Elles sont renseignées sur l'étiquette présente sur le flacon des produits phytosanitaires. Veuillez tenir compte du fait qu'un programme de protection moderne n'est pas statique, mais doit être adapté en fonction de chaque situation. Bayer CropScience ne peut pas être tenu responsable d'une éventuelle mauvaise efficacité de l'un ou l'autre produit cité dans ce schéma et aussi de certains incidents qui pourraient être liés à l'utilisation de ces produits. Pour plus d'informations, aidez-vous des conseils de votre distributeur.

Composition des produits

Decis Trap Cerasi: n° d'agr. 10832P/B; contient 250 g/kg deltaméthrin; marque déposée Bayer

Diflanil 500SC: n° d'agr. 9408P/B; contient 500 g/l diflufenican; marque déposée Q-CHEM

Exirel: n° d'agr. 10989P/B; contient 100 g/l cyantraniliprole; marque déposée FMC

Fusilade Max: n° d'agr. 9476P/B; contient 125 g/l fluazifop-p-butyl; marque déposée Nufarm

Karate Zeon: n° d'agr. 9231P/B; contient 100 g/l lambda-cyhalothrin; marque déposée Syngenta

Luna Experience: n° d'agr. 10432P/B; contient 200 g/l fluopyram en 200 g/l tebuconazole; marque déposée Bayer

Movento 100 SC: n° d'agr. 9797P/B; contient 100 g/l spirotetramat; marque déposée Bayer

Pirimor: n° d'agr. 6640P/B; contient 500 g/kg pirimicarb; marque déposée Adama Registrations BV

Roundup; marques déposées Bayer

Stomp Aqua: n° d'agr 9839P/B; contient 455g/l pendiméthalin; marque déposée BASF

Switch: n° d'agr. 8893P/B; contient 37,5% cyprodinil en 25% fludioxonil; marque déposée Syngenta

Syllit Pro: n° d'agr. 10597P/B; contient 544 g/l dodine; marque déposée Arysta Lifescience

Tebusip: n° d'agr. 9766P/B; contient 250 g/l tebuconazole; marque déposée Oxon Italia

Teldor: n° d'agr. 9059P/B; contient 50% fenhexamid; marque déposée Bayer

Teppeki: n° d'agr 9526P/B; contient 50% flonicamid; marque déposée ISK Biosciences Europe

Tracer: n° d'agr. 9275P/B; contient 480 g/l spinosad; marque déposée Dow Agrosciences

Xentari WG: n° d'agr 9067P/B; contient 15000I.U. *Trichoplia ni/mg Bacillus Thuringiensis* ssp aizawai ABTS-1857; marque déposée Valent Biosciences