



Schéma de pulvérisation pour poires 2023

Dose par Ha de verger standard (y compris les pourtours)



Période	Maladie ou ravageur	Traitement	Remarques
gonflement des boutons (fin février)	chancre, tavelure sur rameau	25% hydroxyde de cuivre 8 kg + soufre	en moyenne max 4 kg de cuivre par an et par ha (max 28kg cuivre / 7 ans)
gonflement des boutons (fin février)	psylle	Surround 20 - 30 kg	jusque début floraison, veillez à une bonne couverture
gonflement des boutons (fin février)	psylle, acariens, pucerons, punaises	Promonal High Performance 30L	attention au gel !
éclatement des boutons	tavelure	Syllit Pro 1,25 L	
oreilles de souris	tavelure	Captan 1,8 kg	
fleurs différenciées	tavelure	Captan 1,8 kg (+ Scala 1,25 L)	Scala en curatif après l'infection
bouton vert	tavelure, chancre	Captan 1,8 kg	
avant floraison	pucerons	Sivanto Prime 0,4 L	remarque: traiter seulement les 2 mètres inférieurs de l'arbre; si 0,6 L/ha alors 1 x / 2 ans
bouton blanc - stade ballon	tavelure	Captan 1,8 kg (+ Geysler 0,15 L)	T° > 12 °C pour Geysler et seulement en curatif après l'infection
début floraison	feu bactérien	Serenade ASO 4 L	effet secondaire sur Pseudomonas, 1 à 2 applications avec un intervalle de 3 à 5 jours, en fonction de l'avancement de la floraison
30 % floraison (facultatif)	mise à fruit ou parthénocarpie (par gel nocturne)	GA4/7 ou GA-3	en fonction de la qualité des boutons et des conditions climatiques pendant la floraison
pleine floraison	tavelure, oïdium, Stemphyllium, rouille	Luna Experience 0,75 L + Delan 0,75 kg	
fin floraison	tavelure, oïdium, tordeuses, carpocapse	Flint 0,15 kg + Delan 0,75 kg + Mimic 0,7 L	
fin floraison	tavelure, oïdium, Stemphyllium, feu bactérien, maladie des boutons morts(Pseudomonas)	Luna Care 3 kg	<i>n'oublier pas de pendre les pièges de confusion sexuelle avant le 1er mai</i>
oeufs blancs psylle(+/- 3 mai)	psylle	Harpun 0,9 L	technique de pulvérisation !
8 à 10 jours après la première application	tavelure, oïdium, Stemphyllium, feu bactérien, maladie des boutons morts(Pseudomonas)	Luna Care 3 kg	
éclosion psylle G2 (+/- 10 mai)	psylle, cochenille, cécidomyies	Movento 2,25 L	rémanence de 3 à 4 semaines !
3ème semaine de mai	maladies bactériennes, tavelure, oïdium, Stemphyllium,	Aliette 3,75 kg + Flint 0,15 kg	
21 jours après la première application	psylle	Movento 2,25 L	rémanence de 3 à 4 semaines !
juin	carpocapse	Coragen 0,18 L	
août	maladies de conservation + carpocapse	Switch 0,75 kg + Xentari 1,5 kg	6 semaines avant la cueillette, Xentari a une efficacité complémentaire sur petites tordeuses (<i>Grapholita lobarzewskii</i>)
août	maladies de conservation	Captan 1,8 kg	4 semaines avant la cueillette
septembre	maladies de conservation	Pomax 1,35 kg	1 semaine avant la cueillette
septembre	maladies de conservation	Geoxe 0,375	3 jours avant la cueillette
après la cueillette	chancre	Captan 1,8 kg	
après la cueillette	chancre	40% hydroxyde de cuivre 3,145 kg	en moyenne max 4 kg de cuivre par an et par ha
après la cueillette	psylle, pucerons	Decis EW 0,71L (contre adultes)	

Appliquer au max 4 SDHs par année (Luna Privilège, Luna Experience, Luna Care, Sercadis, Bellis)

Appliquer max 500 gr Fluopyram par an (Luna Privilège, Luna Experience, Luna Care)

Faire les traitements en fonction des observations au champ

DESHERBAGE Dose par ha traité (à diviser par 2 pour la dose par ha de bande)

Période	Traitement	Remarques
après floraison	Roundup 4 L (360 g/l) ou 3 L (480 g/l)	seulement à partir de la seconde année de croissance
avant saison	Duplosan Super / Gramix Super 2,3 - 2,6 L	
juillet	Diffanil 500SC 0,6 L	
hiver	Kerb 1,55 L + AZ500 1L	

Les données mentionnées dans cette brochure couvrent autant que possible une saison culturale moyenne et reposent sur notre expérience pratique en matière d'essais ainsi que sur des observations réalisées chez les cultivateurs. Elles sont données à titre purement informatif. L'utilisateur doit toujours prendre connaissance des indications d'emploi en matière de produits phytosanitaires ainsi que des mesures de précaution telles que la législation le prévoit. Elles sont renseignées sur l'étiquette présente sur le flacon des produits phytosanitaires. Veuillez tenir compte du fait qu'un programme de protection moderne n'est pas statique, mais doit être adapté en fonction de chaque situation. Bayer CropScience ne peut pas être tenu responsable d'une éventuelle mauvaise efficacité de l'un ou l'autre produit cité dans ce schéma et aussi de certains incidents qui pourrait être liés à l'utilisation de ces produits. Pour plus d'informations, aidez-vous des conseils de votre distributeur.



Schéma de pulvérisation pour poires 2023

Dose par Ha de verger standard (y compris les pourtours)



Composition des produits

Alette WG: n° d'agr. 8692P/B; contient 80% fosétyl; marque déposée Bayer

AZ500: n° d'agr. 7573P/B; contient 500 g/l isoxaben; marque déposée Dow Agrosiences

Captan: n° d'agr. 8759P/B; contient 80% captan; marque déposée ADAMA

Coragen: n° d'agr. 9822P/B; contient 200g/l chlorantraniliprole; marque déposée FMC Chemical SPRL

Decis 15 EW: n° d'agr. 10646P/B; contient 15 g/l deltaméthrin; marque déposée Bayer

Delan : n° d'agr. 8850P/B; contient 700 g/kg dithianon, marque déposée BASF

Diflaniil 500SC: num. d'agr.9408P/B; contient 500 g/l diflufenican; marque déposée de Q-CHEM

Duplosan Super: n° d'agr.10803P/B; contient 600g/l mecoprop-p; marque déposée Nufarm

Flint 50 WG: n° d'agr. 9144P/B; contient 50% trifloxystrobine; marque déposée Bayer

Harpun: n° d'agr. 10800P/B; contient 100 g/l pyriproxifène; marque déposée Galenika-Fitofarmacija

Kerb: n° d'agr. 9606P/B; contient 400 g/l propyzamide; marque déposée Dow Agrosiences

Luna Care: n° d'agr. 10978P/B; contient 5% fluopyram et 66,6% fosétyl; marque déposée Bayer

Luna Experience: n° d'agr. 10432P/B; contient 200 g/l fluopyram et 200 g/l tebuconazole; marque déposée Bayer

Movento 100 SC: n° d'agr. 9797P/B; contient 100 g/l spirotetramat; marque déposée Bayer

Pomax: n° d'agr. 10677P/B; contient 133 g/l fludioxonil et 336 g/l pyriméthanil; marque déposée Globachem

Roundup: marques déposées Bayer

Scala: n° d'agr. 8579P/B; contient 400 g/l pyriméthanil, marque déposée BASF

Serenade ASO: n° d'agr. 10299P/B; contient 13,96 g/l Bacillus Amylolyquefaciens strain QST713, marque déposée Bayer

Sivanto Prime: n° d'agr. 10855P/B; contient 200 g/l flupyradifuron; marque déposée Bayer

Surround WP Crop Protectant; n° d'agr. 9824P/B; contient 95% aluminiumsilicaat; marque déposée Tessenderlo Group

Switch; n° d'agr.8893P/B; contient 37,5% cyprodinil en 25% fludioxonil; marque déposée Syngenta

Syllit Pro: n° d'agr. 10597P/B; contient 544 g/l dodine; marque déposée Arysta Lifescience

Trend: n° d'agr. 9002P/B; contient 900g/l isodécyl-alcool-éthoxylate, marque déposée FMC

Xentari WG: n° d'agr. 9067P/B; contient 15000I.U. Trichoplusia ni/mg Bacillus Thuringiensis ssp aizawai ABTS-1857; marque déposée Valent Biosciences