



Bestrijdingsschema kers 2021



| Tijdstip | Ziekte of plaag | Behandeling | Opmerkingen |
|--|---|--|--|
| zwellende knop | bacteriekanker (<i>Pseudomonas</i>), overwinteringsvormen <i>Monilia</i> (vruchtmummies), roestmijt | 25% Koperhydroxide 8 kg + Zwavel | gemiddeld max 4kg koper per ha per jaar |
| groene knop | bladluis | Teppeki 0,120 kg | min. 400L water/ha |
| volle bloei | bloesem- <i>Monilia</i> en twijgsterte | Luna Experience 0,6 L | |
| einde bloei (bij aanhoudende regen) | bloesem- <i>Monilia</i> , twijgsterte en bladstand | Tebusip 0,75 L | curatieve werking bij t° > 12°C |
| direct na de bloei | bladluis | Teppeki 0,120 kg OF Pirimor 0,75kg | Pirimor toepassen bij warm en windstil weer, bij gekrulde bladeren |
| direct na de bloei | wintervlinders | Steward 0,25 kg | |
| 7 dagen na de bloei | bladstand | Zwavel | |
| 14 dagen na de bloei | hagelschotziekte (<i>Stigmia carpophila</i>) | Zwavel | |
| verkleuren van de vruchten van groen naar geel | kersenvlieg | Decis Trap Cerasi 100 vallen /ha | verkleuren van de eerste vruchten |
| verkleuren van de vruchten van groen naar geel | bij spintaantasting | Envidor 0,6 L | wachttijd van 21 dagen, behandelen aan min. 400 L water/ha, zeker opletten onder overkapping! |
| verkleuren van de vruchten van geel naar rood | kersenvlieg, luizen | Movento 2,25 L | |
| vanaf druk <i>Drosophila</i> | <i>Drosophila suzukii</i> | Karate Zeon 0,135 L // Tracer 0,225 L // Exirel 0,87 L | max 2 toepassingen per middel // deze middelen afwisselen tot wanneer de druk van <i>Drosophila</i> gedaan is |
| 7 dagen voor de pluk | <i>Botrytis</i> , vrucht- <i>Monilia</i> | Switch 1 kg // Teldor 1,5 kg | Switch wachttijd van 4 dagen // Teldor vernevelen met fijne spuitdop en met 300 L water / ha om geen zichtbaar residu na te laten. Wachttijd 3 dagen |
| na de pluk | bladvalziekte (<i>Coccomyces hiemalis</i>) | Syllit 544 Pro 1,25 L | toepassing herhalen na 10 dagen |
| bij bladval | bacteriekanker (<i>Pseudomonas</i>) | 25% Koperhydroxide 8 kg | gemiddeld max 4kg koper per ha per jaar |

Toepassingen afstemmen met waarnemingen in het veld

Dosissen per ha standaardboomgaard, laagstam-aanplanting

ONKRUIDBESTRIJDING

| Tijdstip | Behandeling | | Opmerkingen |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | Pas geplante bomen | Vanaf 2de groeijaar | |
| voorjaar | Stomp Aqua 3 L + Fusilade Max 1,5 L | Stomp Aqua 3 L | |
| zomer | | Roundup 4 L (360gr) of 3 L (480 gr) | indien ook doorlevende onkruiden: groeihormoon bijmengen - vanaf 3 jaar na planten |

De vermelde gegevens zijn naar best vermogen samengesteld voor een gemiddeld teeltseizoen en berusten op praktijkervaring van eigen proefveldwerking en observaties. Ze worden louter informatief aangeboden. De gebruiker dient inzake gewasbeschermingsmiddelen steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke voorzorgsmaatregel zoals die voorkomt op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen. Gelieve er rekening mee te houden dat een modern bestrijdingsschema niet statisch is, maar in functie van elk seizoen dient bijgestuurd te worden. Bayer CropScience kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel, vermeld in dit spuitschema, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. Voor bijkomende vragen, gelieve de raad van uw handelaar in te winnen.

Samenstelling producten

Teppeki: erk. Nr. 9526P/B; bevat 50% flonicamid; gedeponeerd handelsmerk van ISK Biosciences Europe

Envidor: erk.nr. 9409P/B; bevat 240 g/l spirodiclofen; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience

Exirel: erk.nr. 10989P/B; bevat 100 g/l cyantraniliprole; gedeponeerd handelsmerk door FMC

Fusilade Max: erk.nr. 9476P/B; bevat 125 g/l fluazifop-p-butyl; gedeponeerd handelsmerk Nufarm

Gazelle SG: erk.nr. 9807P/B; bevat 20% acetamiprid; gedeponeerd handelsmerk Certis Europe

Karate Zeon: erk.nr. 9231P/B; bevat 100 g/l lambda-cyhalothrin; gedeponeerd handelsmerk Syngenta

Luna Experience: erk.nr. 10432P/B; bevat 200 g/l fluopyram en 200 g/l tebuconazool; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience

Movento 100 SC: erk.nr. 9797P/B; bevat 100 g/l spirotetramat; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience

Roundup; gedeponeerde handelsmerken Bayer CropScience

Steward: erk.nr. 9328P/B; bevat 30% indoxacarb; gedeponeerd handelsmerk FMC

Stomp Aqua: erk.nr. 9839P/B; bevat 455g/l pendimethalin; gedeponeerd handelsmerk BASF

Switch: erk.nr. 8893P/B; bevat 37,5% cyprodinil en 25% fludioxonil; gedeponeerd handelsmerk Syngenta

Syllit Pro: erk.nr. 10597P/B; bevat 544 g/l dodine; gedeponeerd handelsmerk Arysta Lifescience

Tebusip: erk.nr. 9766P/B; bevat 250 g/l tebuconazool; gedeponeerd handelsmerk Oxon Italia

Teldor: erk.nr. 9059P/B; bevat 50% fenhexamid; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience

Tracer: erk.nr. 9275P/B; bevat 480g/l spinosad; gedeponeerd handelsmerk Dow Agrosiences