

	Gevarenaanduidingen	Mentions de danger
H315	Veroorzaakt huidirritatie.	Provoque une irritation cutanée.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.	Provoque de graves lésions des yeux.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
	Veiligheidsaanbevelingen	Conseils de prudence
P280	Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.
P302 +P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
P305 +P310	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement le numéro d'urgence 112.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P332 +P313	Bij huidirritatie: een arts raadplegen.	En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P391	Gelekte/gemorst stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.
	Aanvullende informatie	Information supplémentaire
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
	Bevat natrium diisobutylnaphthaleensulfonaat.	Contient du diisobutyl naphthalènesulfonate de sodium.

WERKINGSWIJZE / MODE D'ACTION:

GROUP

B

HERBICIDES

TEL. ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTIPOISONS: 070/245.245

UFI: RRV0-NOQ8-J00V-G597

Gordium®: trademark of Bayer Group
Actirob B®: Marque déposée/Gedeponeerd handelsmerk Novance
© Copyright Bayer CropScience
Label version: 09/2020

Lotnummer: : Zie op de verpakking/
Numéro de lot: voir sur l'emballage

Toelatingshouder /
Détenant de l'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
Tel. 02/535 63 11
www.cropscience.bayer.be



GHS05



GHS09

Gevaar
Danger
Gefahr



BE86779226B



Gordium® Star

600 g

Herbicide ter bestrijding van windhalm, wilde haver, raagras en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in wintertarwe, winterrogge, wintertriticale en winterspelt. Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 3.3 % iodosulfuron-methyl-sodium, 2.5 % thiencarbazonemethyl en 15.0 % mefenpyr-diethyl (beschermstof).

Herbicide pour lutter contre le jouet du vent, folle avoine, ray-grass et des dicotylées annuelles en froment d'hiver, seigle d'hiver, triticale d'hiver et épeautre d'hiver. Granulés à disperser dans l'eau (WG) à base de 3.3 % d'iodosulfuron-méthyl-sodium, 2.5 % de thiencarbazoneméthyl et 15.0 % de méfenpyr-diéthyl (safener).

Toelatingsnummer /
Numéro d'autorisation: 11043P/B

Gefahrenhinweise	
H315	Verursacht Hautreizungen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	
P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
P302+P352	BEI BЕРÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen mindestens 15 Minuten lang.
P305+P310	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort die Notrufnummer 112 anrufen.
P305 P351+ P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P332+P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen	
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
	Enthält Natriumdiisobutyl-naphthalinsulfonat.

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstijdstip
Wintertarwe, winterrogge, wintertriticale en winterspelt (inclusief zaadproductie) (open lucht)	- Wilde haver en raaigras - Eénjarige tweezaadlobbige onkruiden, waaronder: dovenetel, klaproos, kleefkruid, ereprijs-soorten, akkerviooltje, ...	0.3 kg/ha + 1 l/ha van een product op basis van geësterde koolzaadolie, bv. Actirob B®	In het voorjaar, vanaf het stadium begin uitstoeiing tot en met 1ste knoopstadium van het graangewas (BBCH 21-31)
	- Windhalm en vogelmuur (indien deze alleen voorkomen)	0.2 kg/ha + 1 l/ha van een product op basis van geësterde koolzaadolie, bv. Actirob B®	
Toepassingsvoorwaarden: - Max. 1 toepassing/teelt. - Risicobeperkende maatregelen: altijd minimum 90 % driftreductie toepassen over het volledige veld. Bovendien een bufferzone van 1 meter respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.			

Algemene opmerkingen/aanbevelingen

- Gordium® Star moet altijd toegepast worden in combinatie met een daartoe erkend product op basis van een geësterde koolzaadolie aan de dosis van 1 l/ha (type Actirob B®).
- Gordium® Star toepassen bij groeizaam weer (temperatuur boven de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60 %) en op een gezond graangewas. Niet toepassen op een gewas dat onder stress staat ten gevolge van droogte, wateroverlast, plagen, ziekten, gebreksziekten, bodemcompactatie, slecht wortelsysteem of door andere factoren die de gewasgroei reduceren. Indien nachtvorst verwacht wordt, zal de toepassing enkele dagen uitgesteld worden. Om een optimale bladopname te bekommen mag er geen neerslag vallen binnen de vier uur na de toepassing.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
 - Het product kan irriterend zijn voor de huid onder invloed van het zonlicht.
 - De spuitvloeistof constant roeren tijdens gebruik. Het product niet in de spuittank laten staan.
 - Granen met onderzaai van vlinderbloemigen mogen niet met Gordium® Star behandeld worden.
 - Gordium® Star kan toegepast worden in alle op de markt aanwezige rassen van de teelten waarin het product is toegelaten.
 - **Maatregelen ter voorkoming van resistentievorming**
 - o SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product is B.
 - o Gordium® Star is een herbicide van de familie van de sulfonylureumverbindingen met een 'ALS'-werkwijze (HRAC groep B). Het product mag slechts éénmaal per teelt toegepast worden.
- Volgende richtlijn dient te worden gevolgd om mogelijke ontwikkeling van herbicideresistentie te voorkomen:
- o Een maximaal resultaat wordt verzekerd door gebruik van de optimale dosis tegen het bedoelde onkruid en door het product toe te passen bij de beste weersomstandigheden op een nog weinig ontwikkeld onkruid.
 - o Een behandeling met Gordium® Star niet laten volgen op of laten voorafgaan door een ander 'ALS' - herbicide tegen grassen.
- **Reiniging spuitapparaat**
Gordium® Star behoort tot de groep van de sulfonylureumverbindingen. Daarom is het uiterst belangrijk de tank goed te reinigen (inclusief filters en leidingen) alvorens een bespuiting te gaan uitvoeren in een andere teelt dan de teelten waarin het product toegelaten is.

- Volgteelten

- Na de oogst van granen behandeld met Gordium® Star, zijn volgende teelten mogelijk na een oppervlakkige grondbewerking van 10-15 cm: wintertarwe, zomertarwe, zomergerst, rogge, spelt, triticale, haver, aardappelen, suikerbieten, chicorei, maïs, vlas, stamslabonen, voedererwten, Phacelia, raaigras en wikken.
- Na ploegen zijn in hetzelfde jaar wintergerst en koolzaad mogelijk.
- De zaai of het planten van elke andere teelt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

- Vervangteelten (in geval van gewasmislukking)

Gelieve uw distributeur of Bayer CropScience te contacteren voor meer informatie over de mogelijke vervanggewassen na een teeltmislukking.

- Mengbaarheid:

In geval van tankmenging met andere fytoproducten, eerst het granulaat (WG) in het water van de spuitank laten oplossen. Nadien de andere producten (poeders gevolgd door vloeistoffen) aan de spuitoplossing toevoegen.

BEREIDING VAN DE SPUI TOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

Het product in de voor 1/2 gevulde spuitank gieten. Meng en verder met water aanvullen. De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosissen'.
- SPe3: Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosissen'.
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

- Driftreductie: Vermijd spuitdrift op naburige vegetatie en gronden en op oppervlaktelen en waterlopen. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen. Pas de waterhoeveelheid en rijsnelheid aan om zoveel mogelijk drift op naburige gewassen of waterlopen te vermijden.
- Erosiegevoelige percelen: Het is ten eerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.
- Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen	
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.	
NA INSLIKKEN:	De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING:	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:	Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.	

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Froment d'hiver, seigle d'hiver, triticale d'hiver, épeautre d'hiver (y compris production de semences) (plein air)	- Folle avoine et ray-grass - Dicotylées annuelles, y compris: lamier pourpre, coquelicot, gaillard gratteron, véronique des champs, véronique à feuilles de lierre, véronique de perse, violette des champs	0.3 kg/ha + 1 l/ha d'un produit à base d'huile de colza estérifiée, p.e. Actirob B®	Au printemps, à partir du stade début tallage jusqu'au stade 1e nœud inclus de la céréale (BBCH 21-31)
	- Jouet du vent et mouron des oiseaux (si présent seul) .	0.2 kg/ha + 1 l/ha d'un produit à base d'huile de colza estérifiée, p.e. Actirob B®	
Conditions d'application: - Max. 1 application/culture. - Mesures de réduction du risque: toujours appliquer un pourcentage minimum de 90 % de réduction de la dérive sur toute la parcelle. En plus, respecter une zone tampon de 1 mètre entre la culture à traiter et les eaux de surface.			

Remarques/Recommandations générales

- Gordium® Star doit toujours être utilisé en combinaison avec un produit autorisé sur la base d'une huile de colza estérifiée, à la dose de 1 l/ha (type Actirob B®).
- Gordium® Star s'utilise par temps poussant (température supérieure à 5 °C et humidité relative supérieure à 50 %) et sur une culture saine. Ne pas appliquer sur une culture soumise à un stress dû à la sécheresse, un excès d'eau, des ravageurs, des maladies cryptogamiques, une carence, au compactage du sol, à un système racinaire pauvre ou à d'autres facteurs qui réduisent la croissance de la culture. En cas de gelée nocturne attendue, l'application sera remise pour quelques jours. Afin d'obtenir une absorption foliaire optimale, ne pas traiter si de la pluie est attendue endéans les 4 heures après l'application.

Remarque générale concernant la dose

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réductions du délai avant récolte.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel.

- Le produit peut être irritant pour la peau sous l'influence des rayons solaires. Agiter en permanence la bouillie de pulvérisation. Ne laisser pas le produit dans le réservoir.
- Un froment d'hiver avec un sous-semis de graminées ou de légumineuses ne peut pas être traité avec Gordium® Star.
- Gordium Star® peut être utilisé dans toutes les variétés des cultures disponibles sur le marché dans lesquelles le produit est autorisé.

Mesures pour la prévention du développement de résistance

- SPa1 : Pour éviter le développement de résistance, alternez l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit est B.
- Gordium® Star est un herbicide de la famille des sulfonylurées à mode d'action dit "ALS" (HRAC groupe B). Le produit ne peut être appliqué qu'une seule fois par culture. Pour prévenir l'apparition de mauvaises herbes résistantes aux herbicides à mode d'action "ALS", respecter les consignes suivantes:
 - Assurer un résultat maximum en utilisant la dose agréée sur la graminée visée, en appliquant le produit dans les meilleures conditions climatiques et en traitant des graminées adventices peu développées.
 - Un traitement avec Gordium® Star ne peut pas précéder ou suivre un traitement avec un autre herbicide anti graminées à mode d'action ALS.

Nettoyage du pulvérisateur

Gordium® Star est un herbicide de la famille des sulfonylurées; de ce fait il est très important de bien nettoyer la cuve, les tuyaux et les filtres avant de passer dans d'autres cultures que celles dans lesquelles le produit est autorisé.

Cultures suivantes

- Après la récolte les cultures suivantes sont possibles après un travail de sol de 10 à 15 cm: froment d'hiver, froment de printemps, orge de printemps, seigle, épeautre, triticale, avoine, pomme de terre, betteraves sucrières, chicorée, maïs, lin, haricots verts, pois protéagineux, Phacelia, ray-grass et vesces.
- Après un labour, l'orge d'hiver et le colza sont possible dans la même année.
- L'implantation de toute autre culture se fera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Cultures de remplacement (en cas d'échec de la culture)

Pour des informations concernant les cultures de remplacement possibles en cas d'échec de la culture, veuillez contacter votre distributeur ou Bayer CropScience.

Compatibilité

En cas de mélange avec d'autres produits phyto, laisser d'abord dissoudre le granulé (WG) dans l'eau de la cuve. Ajouter ensuite les autres produits (d'abord les poudres et ensuite les liquides) à la bouillie de pulvérisation.

PREPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé

sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'.
- SPe3: Pour protéger les plantes non-ciblées, appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'.
- En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.
- Réduction de la dérive: Eviter la dérive sur la végétation et les surfaces avoisinantes, ainsi que sur les plans et cours d'eau. Pulvériser en l'absence vent avec une pression adaptée selon les recommandations spécifiques pour les buses antidérive. Ajuster la quantité d'eau et la vitesse pour éviter autant que possible la dérive sur les cultures avoisinantes ou les cours d'eau.
- Parcelles sensibles à l'érosion : Il est recommandé de mettre en place des mesures adaptées sur les parcelles sensibles à l'érosion afin d'empêcher le ruissellement vers les eaux de surface.

MESURES DE PRECAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
 - Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.
- SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche.
Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Enlever les vêtements contaminés.
Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint.
Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

Pour des informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons 070/245.245.**

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur ; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.