



Othello®

5 L

Toelatingsnummer/
Numéro d'autorisation: 9873P/B
N° d'agrément luxembourgeois: L01903-017

Selectief na-opkomst herbicide in wintertarwe, zomertarwe, winterrogge, wintertriticale, zomertriticale, winterspelt en zomerspelt tegen éénjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden.

Herbicide de post-émurgence sélectif en froment d'hiver, froment de printemps, seigle d'hiver, triticale d'hiver, triticale de printemps, epeautre d'hiver et epeautre de printemps contre les graminées et dicotylées annuelles.

Olie dispersie (OD) op basis van 7,5 g/l (0,82 % w/w) mesosulfuron-methyl, 2,5 g/l (0,29 % w/w) iodosulfuron-methyl-natrium, 50 g/l (5,21 % w/w) diflufenican en 22,5 g/l (2,35 % w/w) mefenpyr-diethyl (beschermstof).

Dispersion huileuse (OD) à base de 7,5 g/l (0,82 % w/w) mésosulfuron-méthyl, 2,5 g/l (0,29 % w/w) d'iodosulfuron-méthyl-sodium, 50 g/l (5,21 % w/w) de diflufenican et 22,5 g/l (2,35 % w/w) de méfenpyr-diéthyl (safener).

**Goed schudden voor gebruik.
Bien agiter avant emploi.**

Gevarenaanduidingen		Mentions de danger
H319	Gevoorzaakt ernstige oogirritatie.	Provoque une sévère irritation des yeux.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Veiligheidsaanbevelingen		Conseils de prudence
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.
P305+ P351+ P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+ P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.
P411	Bij maximaal 40 °C bewaren.	Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C
Aanvullende informatie		Information supplémentaire
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

WERKINGSWIJZE / MODE D'ACTION: GROUP 2 (B) 12 (F1) HERBICIDES

Tel. Antigifcentrum / Centre Antipoisons: 070/245.245

Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

UFI: 5GP0-Q0A9-600R-67RH

Waarschuwing
Attention
Achtung



GHS07



GHS09

N° de Lot : voir sur l'emballage.
Lotnr: zie op verpakking
Label version: 07/2022

- © Othello, Liberator, Puma S EW:
Trademark of Bayer Group
- ® Axial : marques déposée de/gedeponeerde
handelsmerk van Syngenta.
- © Copyright BayerCropscience

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation
Bayer CropScience SA-NV
Jan Mommaertsiaan, 14 - 1831 Diegem (Machelen)
Tel. 02/535 63 11 - www.cropscience.bayer.be



BE79530110M

	Gefahrenhinweise
H319 H410	Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
	Sicherheitshinweise
P280 P305+ P351+ P338	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+ P313 P391 P411	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Bei Temperaturen von nicht mehr als 40 °C aufbewahren.
	Ergänzende Informationen
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Wintertarwe, wintertriticale, winterspelt (ook voor zaadproductie) (open lucht)	Gevoelige duist (<i>Alopecurus myosuroides</i>) en gevoelige windhalm (<i>Apera spica-venti</i>)	1,2 l/ha	In het voorjaar, vanaf het stadium begin uitstoeiing tot en met einde uitstoeiing (BBCH 21-29) van het graangewas. Na-opkomst van de onkruiden.
	Moeilijk te bestrijden duist (<i>Alopecurus myosuroides</i>) en/of minder gevoelige windhalm (<i>Apera spica-venti</i>)	2l/ha (Steeds gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist/windhalm die een andere werkwijze hebben (een herfstbehandeling met vb Liberator® gevolgd door Othello® aan 2 L/ha).	
	Straatgras (<i>Poa annua</i>) en raaigras (<i>Lolium</i>)	2 l/ha	
	Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	1,2 l/ha	
Toepassingsvoorwaarden: - Max. 1 toepassing van producten op basis van diflufenican/teelt. - Risicobeperkende maatregelen: altijd minimum 75 % driftreductie toepassen over het volledige veld. Bovendien een bufferzone van 10 meter respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.			

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Zomertarwe, zomertriticale, zomerspelt, winterrogge (ook voor zaadproductie) (open lucht)	Gevoelige duist (<i>Alopecurus myosuroides</i>) gevoelige windhalm (<i>Apera spica-venti</i>) en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden	1,2 l/ha	In het voorjaar, vanaf het stadium begin uitstoeling tot en met einde uitstoeling (BBCH 21-29) van het graangewas. Na-opkomst van de onkruiden.
	Toepassingsvoorwaarden: - Max. 1 toepassing van producten op basis van diflufenican/teelt. - Risicobeperkende maatregel: altijd minimum 50% driftreductie toepassen over het volledige veld. Bovendien een bufferzone van 2 meter respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		

Toepassingstechniek: bespuiting

Algemene opmerkingen/aanbevelingen: Othello® toepassen bij groeizaam weer (relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60 %) en op een gezond graangewas. Niet toepassen op een gewas dat verzwakt of beschadigd is door vorst, wateroverlast, ziekten of gebreksziekten. Indien nachtvorst verwacht wordt, zal de toepassing enkele dagen uitgesteld worden. Om een optimale bladopname te bekomen mag er geen neerslag vallen binnen de vier uur na de toepassing.

Algemene opmerking betreffende de dosis: De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- Granen met onderzaai van grassen of vlinderbloemigen mogen niet met Othello® behandeld worden.
- **Maatregelen ter voorkoming van resistentievorming**
Othello® is een herbicide van de familie van de sulfonylureumverbindingen met een 'ALS'-werkwijze. SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 2 en 12.
- Volgende richtlijnen dienen te worden gevolgd om resistentie tegen herbiciden met een 'ALS'-werkwijze te voorkomen:
 - Een maximaal resultaat wordt verzekerd door gebruik van de erkende dosis tegen het bedoelde onkruidgras en door het product toe te passen bij de beste weersomstandigheden op een nog weinig ontwikkeld onkruid.
 - Een behandeling met Othello® niet laten volgen op of laten voorafgaan door een ander 'ALS'- herbicide (HRAC 2) tegen grassen.
 - In sommige streken (zoals de Polders) is resistente duist of duist die minder gevoelig is aan herbiciden van de FOP-familie of de ureumverbindingen (zoals chloortoluron) reeds sterk verspreid. In deze situaties is het uitvoeren van een spuitschema noodzakelijk, namelijk een najaarsbehandeling gevolgd door een voorjaarsbespuiting, met herbiciden met verschillende werkwijzen.

Om de uitbreiding van de resistentie tegen te gaan moet Othello® altijd aan de erkende dosis worden toegepast. De bestrijding niet baseren op grassenmiddelen die dezelfde werkwijze hebben. Gebruik in opeenvolgende gewassen van de teeltrotatie grassenmiddelen die een verschillende werkwijze hebben.

- Volgteelten

Na de oogst zijn volgende teelten mogelijk na een grondbewerking van 10-15 cm: wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, rogge, spelt, triticale, haver, aardappelen, bieten, cichorei, maïs, vlas, stamslabonen, voedererwten, Phacelia, raaigras en wikken. Koolzaad is mogelijk na ploegen. De zaai of het planten van elke andere teelt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

- Vervangteelten (in geval van gewasmislukking)

Gelieve uw distributeur of Bayer CropScience te contacteren voor meer informatie over de mogelijke vervanggewassen na een teeltmislukking.

- Niet-doelwitorganismen:

SPe3: Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosissen'.

- De bewaarbaarheid van het product is beperkt tot en met 2 jaar, gebaseerd op de resultaten van de bewaarbaarheidsstudie bij kamertemperatuur.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

Product goed schudden voor gebruik en in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen. De spuitoplossing continu roeren tijdens de toepassing. De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelput.

De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

REINIGING SPUITAPPARATUUR

Othello® behoort tot de groep van de sulfonylureumverbindingen. Daarom is het uiterst belangrijk de tank goed te reinigen (inclusief filters en leidingen) alvorens een bespuiting uit te voeren in een andere teelt dan de teelten waarin het product toegelaten is.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de

apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.

- SPe2: Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosissen'.
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.
- Driftreductie: Vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn. Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakten pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen	
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.	
NA INSLIKKEN:	De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING:	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:	Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.	

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Froment d'hiver, triticale d'hiver, épeautre d'hiver (aussi pour la production des semences) (plein air)	Vulpin des champs (<i>Alopecurus myosuroides</i>) et jouet du vent (<i>Apera spica-venti</i>) sensible	1,2 l/ha	Au printemps, du stade début tallage jusqu'au stade fin tallage inclus de la céréale (BBCH 21-29). Post-émergence des mauvaises herbes.
	Vulpin des champs (<i>Alopecurus myosuroides</i>) difficiles à contrôler et/ou jouet du vent (<i>Apera spica-venti</i>) peu sensible	2 l/ha Toujours utiliser dans un programme de désherbage avec des herbicides contre vulpin/jouet du vent ayant un autre mode d'action (un traitement automnal avec un produit comme p.ex. Liberator®, suivi d'Othello® à 2 l/ha).	
	Pâturin annuel (<i>Poa annua</i>) et les ray-grass (<i>Lolium</i>)	2 l/ha	
	Mauvaises herbes dicotylées annuelles	1,2 l/ha	
Conditions d'application: - Max. 1 application de produits à base de diflufenican/culture. - Mesure de réduction du risque: toujours appliquer un pourcentage minimum de 75 % de réduction de la dérive sur toute la parcelle. En plus, respecter une zone tampon de 10 mètres entre la culture à traiter et les eaux de surface.			

Froment de printemps, triticale de printemps, épeautre de printemps, seigle d'hiver (aussi pour la production des semences) (plein air)	Vulpin des champs (<i>Alopecurus myosuroides</i>), jouet du vent (<i>Apera spica-venti</i>) sensibles et les dicotylées annuelles	1,2 l/ha	Au printemps, du stade début tallage jusqu'au stade fin tallage inclus de la céréale (BBCH 21-29). Post-émergence des mauvaises herbes.
Conditions d'application: - Max. 1 application de produits à base de diflufenican/culture. - Mesure de réduction du risque: toujours appliquer un pourcentage minimum de 50 % de réduction de la dérive sur toute la parcelle. En plus, respecter une zone tampon de 2 mètres entre la culture à traiter et les eaux de surface.			

Méthode d'application: pulvérisation

Remarques/Recommandations générales: L'Othello® s'utilise par temps poussant (humidité relative supérieure à 60 %) et sur une culture saine, qui n'est pas affaiblie ou endommagée par le gel, un surplus d'eau, des maladies cryptogamiques ou une carence. En cas de gelée nocturne attendue, l'application sera retardée de quelques jours. Afin d'obtenir une absorption foliaire optimale, ne pas traiter si de la pluie est attendue endéans les 4 heures après l'application.

Remarque générale concernant la dose: La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réductions du délai d'attente.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel.
- Des céréales avec un sous-semis de graminées ou de légumineuses ne peut pas être traité avec Othello®.
- **Mesures pour la prévention du développement de la résistance :**
 Othello® est un herbicide de la famille des sulfonilurées à mode d'action dit «ALS».
 - SPA1 : Pour éviter le développement de résistance, alternez l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 2 et 12. Pour prévenir l'apparition de mauvaises herbes résistantes aux herbicides à mode d'action «ALS», respecter les consignes suivantes:
 - Assurer un résultat maximum en utilisant la dose agréée sur la graminée visée, en appliquant le produit dans les meilleures conditions climatiques et en traitant des graminées adventices peu développées.
 - Un traitement avec Othello® ne peut pas précéder ou suivre un traitement avec un autre herbicide anti-graminées à mode d'action ALS (HRAC 2 (B)).

- Dans certaines régions (dont les Polders), des vulpins résistants ou moins sensibles aux herbicides de la famille des FOP's et des urées (dont le chlortoluron) sont déjà bien répandus. Dans ces situations, la mise en place d'un schéma de traitements incluant un traitement automnal suivi d'un traitement au printemps avec des produits à mode d'action différent est impératif. Pour éviter l'extension de la résistance des vulpins, appliquer toujours la dose agréée de l'Othello®. Ne pas baser la lutte sur des herbicides anti-graminées possédant le même mode d'action. Utiliser des herbicides anti-graminées à mode d'action différent dans les cultures qui se suivent dans la rotation.

- Cultures suivantes:

- Après la récolte les cultures suivantes sont possible après un travail de sol de 10 à 15 cm: froment d'hiver, froment de printemps, escourgeon, orge de printemps, seigle, épeautre, triticale, avoine, pomme de terre, betteraves, chicorée, maïs, lin, haricots verts, pois protéagineux, Phacelia, ray-grass et vesces.

- Le colza est possible après un labour.

- L'implantation de toute autre culture se fera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

- Cultures de remplacement (en cas d'échec de la culture):

Pour des informations concernant les cultures de remplacement en cas d'échec de la culture veuillez contacter votre distributeur ou Bayer CropScience.

- Organismes non-cibles:

SPe3: Pour protéger les plantes non-ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'.

- Sur base de l'étude de stabilité à température ambiante, la stabilité du produit est limitée à 2 ans.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Bien agiter le produit avant usage et remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. Agiter constamment la bouillie de pulvérisation lors de l'application. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Othello® est un herbicide de la famille des sulfonylurées; de ce fait, il est très important de bien nettoyer la cuve, les tuyaux et les filtres avant de passer dans d'autres cultures que les cultures dans lesquelles le produit est autorisé.

MESURES POUR ÉVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.
- SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme «sterk erosiegevoelig». Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'.
- En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.
- Réduction de la dérive: Eviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses antidérive.

MESURES DE PRÉCAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.
- SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION:

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Enlever les vêtements contaminés.

Laver abondamment à l'eau.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour des informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons +32 (0)70/245.245.**
Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500.

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur ; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.