

Nederlandstalige versie van het etiket in het booklet hierachter.
Pour la version française de l'étiquette, voir à l'arrière du bidon.



BE89357551C



PREVICUR[®]
ENERGY

3 L

Toelatingsnummer / N° d'autorisation: 9826P/B

Systemisch fungicide in groententeelt en sierteelt

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 530 g/l (47,3 % w/w) propamocarb en 310 g/l (27,7 % w/w) fosetyl (FU).

Fongicide systémique en cultures légumières et ornementales.

Concentré soluble (SL) contenant 530 g/l (47,3 % w/w) de propamocarbe et 310 g/l (27,7 % w/w) de fosétyl (FU).

EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE

Previcur® Energy is een fungicide op basis van de werkzame stoffen propamocarb en fosetyl.

Fosetyl is een multi-site remmer met een preventieve werking. Propamocarb heeft een systemische werking en wordt opgenomen door het blad en de wortels, waarna de stof opwaarts in de plant wordt getransporteerd. Propamocarb beïnvloedt de permeabiliteit van de celmembranen.

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik. De gewasgroepen in de tabel hieronder geven structuur aan het etiket. Enkel de specifiek vermelde gewassen onder de kolom 'teelt' zijn toegelaten. De gebruiksvoorwaarden moeten per gewas geraadpleegd worden.

A. VRUCHTGROENTEN

Teelt: Komkommer, aubergine/eierplant en pepino, courgette/ patisson en augurk (onder bescherming) op kunstmatig substraat

Ter bestrijding van: kiemschimmels. **Dosis:** 100 ml/plant van een oplossing van 0,067 tot 0,20 %

Previcur® Energy. **Ter bestrijding van:** wortelphytophthora. **Dosis:** 3 l/ha, toepassingstechniek: druppelirrigatie.

Toepassingstijdstip van de teelt: Een behandeling uitvoeren na het op de matten zetten of bij een beginnende aantasting. Stadium BBCH 12 - 89. Preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting.

Toepassingsvoorwaarden:

- Maximum 4 toepassingen / teelt.
- Tegen kiemschimmels: 1^{ste} toepassing: 1 l/ha, 2^{de}, 3^{de} en 4^{de} toepassing: 3 l/ha (op basis van 15000 planten/ha).
- Veiligheidstermijn vóór de oogst: 3 dagen.
- Tegen wortelphytophthora dient het middel meegedruppeld te worden met het irrigatiesysteem.
- De behandeling eventueel herhalen.
- Tegen kiemschimmels: in verband met de kans op fytotoxiciteit: in de eerste 10 dagen na het uitplanten maximaal 1 l/ha gebruiken.

Teelt: Tomaat en paprika/Spaanse peper (onder bescherming) op kunstmatig substraat

Ter bestrijding van: kiemschimmels. **Dosis:** 100 ml/plant van een oplossing van 0,12 % Previcur® Energy; de dosis komt overeen met 3 l Previcur® Energy/ha, berekend op basis van 25000 planten per ha. **Ter bestrijding van:** Wortelphytophthora. **Dosis:** 3 l/ha, Toepassingstechniek: druppelirrigatie. **Toepassingstijdstip van de teelt:** Een behandeling uitvoeren na het op de matten zetten of bij een beginnende aantasting. Stadium BBCH 12 - 89. Preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting.

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 4 toepassingen/teelt. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 3 dagen. • Tegen wortelphytophthora dient het middel dient meegedruppeld te worden met het irrigatiesysteem. • De behandeling eventueel herhalen.

Teelt: Augurk (open lucht)

Ter bestrijding van: wortelphytophthora. **Dosis:** 2,5 l/ha.

Toepassingstijdstip van de teelt: Preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting.

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 2 toepassingen. • Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 3 dagen.

B. BLADGROENTEN EN KRUIDEN

Teelt: Slasoorten (kropsla, ijsbergsla, Lollo rossa, Lollo bionda, romeinse sla, eikenbladsla)
(onder bescherming)

Ter bestrijding van: valse meeldauw. **Dosis:** 2,5 l/ha.

Toepassingstijdstip van de teelt: Vanaf het 2-bladstadium tot oogstgrootte (BBCH 12-49). Vanaf het waarnemen van de eerste symptomen. **Toepassingsvoorwaarden:** • Maximum 2 toepassingen / teelt, met een interval van 10 dagen. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 21 dagen.

Teelt: Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming)

Ter bestrijding van: valse meeldauw. **Dosis:** 2,5 l/ha.

Toepassingsstijdstip van de teelt: Vanaf het 2-bladstadium tot oogstgrootte (BBCH 12-49).

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 1 toepassing /teelt. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 21 dagen.

Teelt: Spinazie (open lucht en onder bescherming)

Ter bestrijding van: valse meeldauw (wolf). **Dosis:** 2,5 l/ha.

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 1 toepassing per teelt. • Risicobeperkende maatregelen in open lucht: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 14 dagen in open lucht en 21 dagen onder bescherming.

Teelt: Tuinkers en andere kiemen en scheuten (onder bescherming)

Ter bestrijding van: valse meeldauw. **Dosis:** 2,5 l/ha

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 1 toepassing /teelt. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 21 dagen. • Om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Teelt: Rode amsoi (consumptie bladeren), babyleaf (geogst tot het stadium 8 bladeren), rucola (onder bescherming)

Ter bestrijding van: valse meeldauw. **Dosis:** 2,5 l/ha

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 1 toepassing per teelt. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 21 dagen. • Om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Teelt: Roomse kervel, bieslook, snijselder, koriander, dille, karwij, lavas/maggiplant, engelwortel, kervel, peterselie, salie, rozemarijn, tijm, marjolein, oregano, citroenmelisse, basilicum, munt, laurier, dragon (consumptie bladeren), **eetbare bloemen** (onder bescherming)

Ter bestrijding van: kiemschimmels. **Dosis:** 2,5 l/ha

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 1 toepassing /teelt. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 21 dagen (geen voor roomse kervel). • Om gewasbeschadiging te voorkomen, is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Teelt: Witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur & grondteelt) (onder bescherming).

Ter bestrijding van: *Phytophthora cryptogea* en *pythium*..

Dosis: 20 ml/m². **Toepassingstijdstip van de teelt:** Onmiddellijk na intafelen. Toepassen over de wortelkragen voor het begin van de forcerie. **Toepassingstechniek: kraagbehandeling.**

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 1 toepassing / teelt. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 21 dagen. • Om overschrijdingen van de MRL te voorkomen, is het verboden om fosetyl toe te passen tijdens de opslag of de forcering van wortels die reeds op het veld behandeld werden met fosetyl. • Waarschuwing: - Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naooogst behandelingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be/nl/witloofwortels.

Teelt: Witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur) (onder bescherming).

Ter bestrijding van: *Phytophthora cryptogea*.

Dosis: 40 ml / 100 l voedingsoplossing. **Toepassingstijdstip van de teelt:** Bij het begin van de forcerie (hydrocultuur). **Toepassingstechniek: voedingsoplossing** **Toepassingsvoorwaarden:** • Maximum 1 toepassing/teelt. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 21 dagen. • Om overschrijdingen van de MRL te voorkomen, is het verboden om fosetyl toe te passen tijdens de opslag of de forcering

van wortels die reeds op het veld behandeld werden met fosetyl. • Waarschuwing: - Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naoogst behandelingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be/nl/witloofwortels.

C. SIERPLANTEN

Teelt: Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)

Ter bestrijding van: Kiemschimmels, blad- en takphytophthora en valse meeldauw.

Dosis: blad- en takphytophthora en kiemschimmels : 0,3 l/100 l

Toepassingstijdstip van de teelt: Preventief of vanaf het waarnemen van de eerste aantasting. Voor toepassingen in open lucht behandelen voor de bloemvorming (< BBCH 40).

Ter bestrijding van: Wortelphytophthora.

Dosis: 0,03 l/100 l. Toepassingstechniek: aangieten. Max 10% van het (pot)grondvolume aangieten.

Toepassingstijdstip van de teelt: Preventief of vanaf het waarnemen van de eerste aantasting.

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 4 toepassingen/teelt in total, waarvan maximum 1 toepassing tegen wortelphytophthora. • Risicobeperkende maatregelen in open lucht: een minimale bufferzone van 3 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Viola.

Teelt: Sierplanten (open lucht)

Ter bestrijding van: Kiemschimmels, blad- en takphytophthora en valse meeldauw.

Dosis: 0,3 l/100 l **Toepassingstijdstip van de teelt:** Preventief of vanaf het waarnemen van de eerste aantasting. Behandelen voor de bloemvorming (< BBCH 40).

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 4 toepassingen/teelt. • Risicobeperkende maatregelen in

open lucht: een minimale bufferzone van 3 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

Toepassingstechniek: bespuiting tenzij het anders gespecificeerd wordt bij een specifieke teelt of plaag.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

GBRUIKEN CONFORM ARTIKEL 51 EG 1107/2009

Het gebruik van Previcur® Energy in de teelten vermeld in onderstaande tabel is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen weinig of geen werkzaamheids- en/of fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Teelt: Aardbeiplanten (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)

Ter bestrijding van: Stengelbasisrot en rood wortelrot. **Dosis:** 300 ml/100 l

Toepassingstijdstip van de teelt: Voor het planten; vanaf het stadium opzwellen van hoofdknop tot het stadium 9 of meer bladeren ontvouwen (BBCH 03-19)

Toepassingstechniek: dompelen (beghandeling van plantmateriaal)

Toepassingsvoorwaarden: •Maximum 1 toepassing/ teelt. Risicobeperkende maatregelen: een

minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Om overschrijding van de MRL te voorkomen moet een tijdspanne van minstens 30 dagen gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of planten van de volgende teelt.

Teelt: Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht en onder bescherming)

Ter bestrijding van: Stengelbasisrot en rood wortelrot. **Dosis:** 80 ml/100 l

Toepassingstijdstip van de teelt: Vanaf het stadium opzwellen van hoofdknop tot het stadium verschillende dochterplanten ingeworteld en klaar om te planten (BBCH 03-49)

Toepassingstechniek: druppelirrigatie of aangieten **Toepassingsvoorwaarden:** • Maximum 1 toepassing/teelt en maximum 2,36 l/ha. • Risicobeperkende maatregelen in open lucht: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Om overschrijding van de MRL te voorkomen moet een tijdspanne van minstens 30 dagen gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of planten van de volgende teelt.

Teelt: Knolselder en knolvenkel (onder bescherming)

Ter bestrijding van: Kiemschimmels. **Dosis:** 3 ml/m² in 3 l/m²

Toepassingstijdstip van de teelt: Onmiddellijk na het zaaien. **Toepassingstechniek:** aangieten

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 2 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen. • Om overschrijding van de MRL te voorkomen moet een tijdspanne van minstens 30 dagen gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of planten van de volgende teelt.

Teelt: Meloen, watermeloen en pompoen (onder bescherming)

Ter bestrijding van: Wortelphytophthora en kiemschimmels. **Dosis:** - 1 l/ha voor de 1ste toepassing - 3 l/ha voor 2de toepassing (min. 7 dagen na de 1ste) - 3 l/ha voor de 3de toepassing (min. 28 dagen na de 2de) - 3 l/ha voor de 4de toepassing (min. 28 dagen na de 3de)

Toepassingstechniek: aangieten of druppelirrigatie

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 4 toepassingen/teelt. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 3 dagen. • In verband met de kans op fytoxiciteit: in de eerste 10 dagen na het uitplanten maximaal 1 l/ha gebruiken. • Om overschrijding van de MRL te voorkomen moet een tijdspanne van minstens 30 dagen gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of planten van de volgende teelt.

Teelt: Raapstelen (onder bescherming)

Ter bestrijding van: Wortelphytophthora en kiemschimmels. **Dosis:** 0.3 L/100 m²

Toepassingstijdstip van de teelt: ≤ BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen). **Toepassingstechniek:** aangieten

Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 2 toepassingen/teelt, met een interval van 7 - 10 dag(en) tussen twee toepassingen.

Toepassingstechniek: bespuiting tenzij het anders gespecificeerd wordt bij een specifieke teelt.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

• Product bestemd voor beroepsgebruik. • Maatregelen ter voorkoming van resistentievorming SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 33 en 28. • Gewasveiligheid: Let op : het gebruik van het product werd enkel

getest bij normale temperaturen. Bij extreme temperaturen is de gewasveiligheid niet bewezen en wordt een toepassing ten stelligste afgeraden. • Om mogelijke fytotoxiciteit te vermijden bij jonge, gevoelige gewassen onder bescherming, Previcur® Energy niet toepassen tijdens perioden van grote temperatuurschommelingen tussen dag- en nachttemperaturen.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN: Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen. De ledige verpakking dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (3 opeenvolgende malen schudden) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor een ander doel. De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en deze verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTewater

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosissen'.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

Driftreductie: Vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijnsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen.

Erosiegevoelige percelen: het is ten zeerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan.

VOORZORGSMAATREGELEN: Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn. Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

SPo: Na de behandeling de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Teelten onder bescherming: Voordat u opnieuw in behandelde ruimten / kassen binnengaat, moet u die gedurende minimum 2 uur ventileren tot de sproeistof is opgedroogd.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:	De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING:	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:	Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, **contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.**

WAARBORG: Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

	Gefahrenhinweise
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Sicherheitshinweise
P261	Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
P302+ P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mindestens 15 Minuten Mit viel Wasser waschen.
P333+ P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	Ergänzende Informationen
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

PROPRIÉTÉS ET MODE D'ACTION

Previcur® Energy est un fongicide à base des matières actives propamocarbe et fosétyl. Le

fosétyl est un inhibiteur multi-site à action préventive. Le propamocarbe a une action systémique et est absorbé par les feuilles et les racines, pour être transporté vers les parties aériennes des plantes. Le propamocarbe influence la perméabilité des membranes cellulaires.

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit. Dans le tableau ci-dessous, les plantes cultivées ont été regroupées afin de structurer l'étiquette. Seules les cultures mentionnées dans la colonne 'culture' sont autorisées. Les conditions d'utilisation doivent être consultées pour chaque culture.

A. LÉGUMES-FRUITES

Concombre, aubergine et pépinois, courgette/
pâtisson et cornichon (sous protection) sur
substrat artificiel

Pour lutter contre: la fonte des semis. **Dose:** 100 ml / plante d'une solution avec une concentration de 0,067 à 0,20 % de Previcur®

Energy. **Pour lutter contre:** le phytophthora des racines. **Dose:** 3 l/ha, irrigation goutte-à-goutte.

Stade d'application de la culture: Effectuer une application après la mise sur substrat ou au début d'une attaque. Stade BBCH 12 - 89. Préventivement ou aux premiers signes d'infestation.

Conditions d'application: • Maximum 4 applications /culture. • Contre la fonte des semis: 1e application: 1l/ha, 2e, 3e et 4e application: 3 l/ha (sur base de 15 000 plantes/ha). • Délai avant récolte: 3 jours. • Contre le phytophthora des racines, le produit doit être appliqué par le système d'irrigation goutte à goutte. • Répéter éventuellement l'application. • Contre la fonte des semis, en raison de la possibilité de phytotoxicité, appliquer au maximum 1 l/ha endéans les 10 jours après la plantation.

Culture: Tomate et poivron/piment (sous protection) sur substrat artificiel

Pour lutter contre: la fonte de semis. **Dose:** 100 ml par plante d'une solution avec une concentration de 0,12 % de Previcur® Energy; le dosage correspond à 3 l de Previcur® Energy/ha, calculé sur base de 25000 plantes par ha. **Pour lutter contre:** le phytophthora des racines. **Dose:** 3 l/ha. Méthode d'application : irrigation goutte-à-goutte. **Stade d'application de la culture:** Effectuer une application après la mise sur substrat ou au début d'une attaque. Stade BBCH 12 - 89.

Préventivement ou aux premiers signes d'infestation.

Conditions d'application: • Maximum 4 applications / culture. • Délai avant récolte: 3 jours. • Le produit doit être appliqué par le système d'irrigation goutte à goutte. • Répéter éventuellement l'application.

Culture: Cornichon (plein air)

Pour lutter contre: le phytophthora des racines. **Dose:** 2,5 l/ha.

Stade d'application de la culture: Préventivement ou aux premiers signes d'infestation.

Conditions d'application: • Maximum 2 applications /culture. • Mesures de réduction du risque:

2 respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et

les eaux de surface. • Délai avant récolte: 3 jours.

B. LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

Culture: Laitues (laitue pommée, laitue iceberg, Lollo rossa, Lollo bionda, laitue romaine, laitue feuille de chêne) (sous protection)

Pour lutter contre: le mildiou de la laitue. **Dose:** 2,5 l/ha. **Stade d'application de la culture:** Stade 2 feuilles jusqu'à la récolte (BBCH 12-49). Dès l'observation des premiers symptômes.

Conditions d'application: • Maximum 2 applications /culture avec un intervalle de 10 jours. • Délai avant récolte: 21 jours.

Culture: Endives, radicchio rosso et pain de sucre (sous protection)

Pour lutter contre: le mildiou de la laitue. **Dose:** 2,5 l/ha. **Stade d'application de la culture:** Stade 2 feuilles jusqu'à la récolte (BBCH 12-49).

Conditions d'application: • Maximum 1 application/culture. • Délai avant récolte: 21 jours.

Culture: Epinard (plein air et sous protection)

Pour lutter contre: le mildiou de l'épinard. **Dose:** 2,5 l/ha. **Conditions d'application:** • Maximum 1 application/culture. • Mesures de réduction du risque en plein air: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 14 jours en plein air et 21 jours sous protection.

Culture: Cresson alénois et autres jeunes pousses (sous protection)

Pour lutter contre: Le mildiou du chou. **Dose:** 2,5 l/ha.

Conditions d'application: • Maximum 1 application/culture. • Délai avant récolte: 21 jours.

• Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur

quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Moutarde brune (consommation des feuilles), **jeunes pousses** (récoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles), **roquette** (sous protection)

Pour lutter contre: Le mildiou. **Dose:** 2,5 l/ha.

Conditions d'application: • Maximum 1 application/culture. • Délai avant récolte: 21 jours.

• Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Culture: Cerfeuil musqué, ciboulette, céleri à couper, coriandre, aneth, carvi, livèche, angélique, cerfeuil, persil, sauge officinale, romarin, thym, origan/ marjolaine, mélisse, basilic, menthe, laurier, estragon (consommation des feuilles), fleurs comestibles (sous protection).

Pour lutter contre: la fonte de semis. **Dose:** 2,5 l/ha.

Conditions d'application: • Maximum 1 application/culture. • Délai avant récolte: 21 jours.(aucun pour le cerfeuil musqué). • Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Culture: Witloof et chicon rouge (forcerie hydroponique & forcerie en fosse) (sous protection).

Pour lutter contre: Le mildiou et Pythium **Dose:** 20 ml/m². **Stade d'application de la culture:** Immédiatement après la mise en table. Pulvérisation des collets de racines avant le début de la forcerie.

Méthode d'application: traitement du collet. **Conditions d'application:** • Maximum 1 application/culture. • Délai avant récolte : 21 jours.

• Afin d'éviter le dépassement de la LMR il est interdit d'appliquer du fosétyl lors de la conservation ou le forçage des racines ayant déjà été traité en champ avec du fosétyl. Avertissement : Les

recommandations de bonnes pratiques agricoles pour les traitements post-récolte sont disponibles sur www.phytoweb.be/fr/racines-witloof.

Culture: Witloof et chicon rouge (forcerie hydroponique) (sous protection). **Pour lutter contre:** le mildiou. **Dose:** 40 ml / 100 l de solution nutritive. **Stade d'application de la culture:** Au début du forçage (forcerie hydroponique). **Méthode d'application:** solution nutritive. **Conditions d'application:**

- Maximum 1 application/culture.
- Délai avant récolte: 21 jours.
- Afin d'éviter le dépassement de la LMR il est interdit d'appliquer du fosétyl lors de la conservation ou le forçage des racines ayant déjà été traité en champ avec du fosétyl.
- Avertissement : Les recommandations de bonnes pratiques agricoles pour les traitements post-récolte sont disponibles sur www.phytoweb.be/fr/racines-witloof.

C. PLANTES ORNEMENTALES

Culture: Plantes ornementales (non destinées à la consommation) (sous protection)

Pour lutter contre: La fonte de semis et le mildiou des plantes ornementales. **Dose:** 0,3l/100l
Stade d'application de la culture: Préventivement ou aux premiers signes d'infestation. **Pour lutter contre:** Le phytophthora des racines. **Dose:** 0,03 l/100 l **Méthode:** arrosage. Arroser max. 10 % du volume du sol. **Stade d'application de la culture:** Préventivement ou aux premiers signes d'infestation. **Conditions d'application:**

- Maximum 4 applications/culture au total, dont maximum 1 application contre le phytophthora des racines.
- Mesures de réduction du risque en plein air: respecter une zone tampon minimale de 3 mètres avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.
- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce (s) suivant(es): Viola.

Culture: Plantes ornementales (plein air)

Pour lutter contre: La fonte des semis et le mildiou des plantes ornementales. **Dose:** 0,3l/100l

Stade d'application de la culture: Préventivement ou aux premiers signes d'infestation. Traiter avant la formation des fleurs (< BBCH 40). **Conditions d'application:** • Maximum 4 applications/culture
• Mesures de réduction du risque : respecter une zone tampon minimale de 3 mètres avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

Méthode d'application : pulvérisation sauf indication contraire pour une culture ou une maladie spécifique.

Remarque générale concernant la dose: La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

USAGES CONFORMES A L'ARTICLE 51 DU REGLEMENT 1107/2009

L'utilisation du produit Previcur® Energy dans les cultures mentionnées dans le tableau ci-dessous a été évaluée conformément à l'article 51 du Règlement européen 1107/2009. Peu ou pas d'étude d'efficacité et/ou de phytotoxicité n'a été effectuée pour cet usage. Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ. L'utilisation de ce produit dans ces cultures tombe donc sous la responsabilité de l'utilisateur.

Culture: Fraisiers (champ de sélection et de multiplication) (plein air)

Pour lutter contre: Le mildiou du fraisier et la maladie du cœur rouge des racines. **Dose:** 300 ml/100l

Stade d'application de la culture: Avant la plantation; à partir du stade gonflement du bourgeon principal jusqu'au stade 9 ou davantage de feuilles sont étalées (BBCH 03-19).

Méthode d'application: Trempage (traitement de matériel végétal) **Conditions d'application:**

- Maximum 1 application/culture. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.
- Afin d'éviter un dépassement de la LMR, un délai de minimum 30 jours entre le dernier traitement et le semis ou la plantation de la culture suivante doit être respecté.

Culture: Fraisiers (champ de sélection et de multiplication) **Pour lutter contre:** Le mildiou du fraisier et la maladie du cœur rouge des racines. **Dose:** 80 ml/100 l. **Stade d'application de la culture:** Du stade gonflement du bourgeon principal au stade où plusieurs jeunes plantes filles sont développées et prêtes à la plantation (BBCH 03-49). **Méthode d'application:** Irrigation goutte à goutte ou arrosage. **Conditions d'application:** • Maximum 1 application/culture et maximum 2,36 l/ha. • Mesures de réduction du risque en plein air: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Afin d'éviter un dépassement de la LMR, un délai de minimum 30 jours entre le dernier traitement et le semis ou la plantation de la culture suivante doit être respecté.

Culture: Céleri-raves et fenouil (sous protection)

Pour lutter contre: La fonte des semis. **Dose:** 3 ml/m² dans 3 l/m²

Stade d'application de la culture: Immédiatement après le semis.

Méthode d'application: arrosage **Conditions d'application:** • Maximum 2 applications, avec un intervalle de 7-10 jours. • Afin d'éviter un dépassement de la LMR, un délai de minimum 30 jours entre le dernier traitement et le semis ou la plantation de la culture suivante doit être respecté.

Culture: Melon, pastèque et potiron (sous protection)

Pour lutter contre: Le phytophthora des racines et la fonte des semis **Dose:** - 1 l/ha pour la 1^e

application - 3 l/ha pour la 2e application (min. 7 jours après la 1e) - 3 l/ha pour la 3e application (min. 28 jours après la 2e) - 3 l/ha pour la 4e application (min. 28 jours après la 3e)

Méthode d'application: arrosage ou irrigation goutte à goutte. **Conditions d'application:**

- Maximum 4 applications/culture.
- Délai avant récolte : 3 jours.
- En raison de la possibilité de phytotoxicité, appliquer au maximum 1 l/ha endéans les 10 jours après la plantation.
- Afin d'éviter un dépassement de la LMR, un délai de minimum 30 jours entre le dernier traitement et le semis ou la plantation de la culture suivante doit être respecté.

Culture: Cimi di rapa (sous protection)

Pour lutter contre: Le phytophthora des racines et la fonte des semis **Dose:** 0.3 L/100 m²

Stade d'application de la culture: ≤ BBCH 12 (2 feuilles étalées)

Méthode d'application: arrosage. **Conditions d'application:** • Maximum 2 applications/culture, avec un intervalle de 7 - 10 jour(s) entre deux applications.

Méthode d'application: pulvérisation sauf indication contraire pour une culture spécifique.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à usage professionnel.
- Mesures pour la prévention du développement de la résistance : SPA1 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 33 et 28. Sélectivité : • Remarque: l'utilisation du produit n'a été testée qu'à des températures normales. La sélectivité pour les cultures n'a pas été prouvée à des températures extrêmes et l'application est fortement déconseillée dans de telles conditions.
- Pour éviter de la phytotoxicité dans les cultures jeunes et sensibles sous protection, ne pas appliquer le Previcur® Energy pendant les périodes où les variations de température entre jour et nuit sont trop élevées.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE

TRAITEMENT: Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage vide doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR ÉVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'. En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

Réduction de la dérive: Éviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques

pour les buses antidérive.

Parcelles sensibles à l'érosion: il est recommandé de mettre en place des mesures adaptées sur les parcelles sensibles à l'érosion afin d'empêcher le ruissellement vers les eaux de surface.

MESURES DE PRÉCAUTION

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques. Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel. Cultures sous protection: ventiler pendant minimum 2 heures jusqu'au séchage du produit pulvérisé les zones / serres traitées avant d'y accéder. SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins	
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	
EN CAS D'INGESTION :	Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

**EN CAS
D'INHALATION :**

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

**EN CAS DE
CONTACT AVEC LA
PEAU :**

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**EN CAS DE
CONTACT AVEC
LES YEUX :**

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour des informations complémentaires, **contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.**

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.