

Roundup[®] PowerMax



Een herbicide
van Bayer
Un herbicide
de Bayer
www.roundup.be



Hoge concentratie

480 g/l glyfosaat werkzame stof

Formulation plus concentrée

480 g/l de matière active de glyphosate



Regenvastheid

Regenvast na 1 uur

Résistance à la pluie

Résiste à la pluie après 1 heure



Korte wachttijd voor grondbewerking

*Court délai d'attente
avant travail du sol*



Weersonafhankelijk

Beste werking onder moeilijke omstandigheden

Indépendant des conditions climatiques

Meilleure efficacité sous les conditions difficiles

Niet-selectief bladherbicide voor gebruik in uien, bieten, aardappelen, maïs, kerstsparren, grasland-weiland, gazons en grasvelden, golfterreinen, tijdelijk onbeteelde landbouwgronden, verharde permanent onbeteelde terreinen, niet verharde permanent onbeteelde terreinen, spoorwegen en alle teelten.

Toelatingsnummer: 10086P/B

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 480 g/l glyfosaat (35,7% w/w)
De werkzame stof glyfosaat is aanwezig onder de vorm van een isopropylaminezout en het gewaanborge gehalte is uitgedrukt in zuurequivalent.

HERBICIDE foliaire non-sélectif pour usage en oignons, betteraves, pommes de terre, maïs, sapins de Noël, prairies, gazons et pelouses, terrains de golf, terres agricoles en interculture, terrains meubles non cultivables en permanence, terrains revêtus, non cultivables, chemins de fer et toutes cultures.

Numéro d'autorisation: 10086P/B

Concentré soluble (SL) à base de 480 g/l de glyphosate (35,7% w/w)
La substance active glyphosate est présente sous forme de sel isopropylamine.
La teneur garantie est exprimée en équivalent acide.

Roundup[®] PowerMax: Trademark of Bayer Group

Lotnummer en productiedatum/Numéro de lot et date de production:
Zie op de verpakking/Voir sur l'emballage

Label version: 12/2020

© Copyright Bayer



www.agrirecover.eu

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation :

Bayer Agriculture BVBA
SCHEDELAAN 460 - HAVEN 627
2040 Antwerpen
Tel. 02/ 535 63 11



MON30116064A

Inhoud/Contenu:

15 L



5 411773 112435

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Oignons (récoltés secs) et oignons de printemps (plein air)	Mauvaises herbes	1,5-3 l/ha	En pré-émergence de la culture (BBCH 01-08), sur végétation développée
	Conditions d'application : - Max. 3,6 kg glyphosate/ha/12 mois. - Maximum 1 application. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Betteraves sucrières et betteraves fourragères (plein air)	Mauvaises herbes	1,5-3 l/ha	En pré-émergence de la culture (BBCH 01-08), sur végétation développée
	Conditions d'application : - Max. 3,6 kg glyphosate/ha/12 mois. - Maximum 1 application. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Pommes de terre (plein air)	Mauvaises herbes	1,5-3 l/ha	En pré-émergence de la culture (BBCH 01-08), sur végétation développée
	Conditions d'application : - Max. 3,6 kg glyphosate/ha/12 mois. - Maximum 1 application. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Maïs (sauf maïs doux) (plein air)	Mauvaises herbes	1,5-3 l/ha	En pré-émergence de la culture (BBCH 01-08), sur végétation développée
	Conditions d'application : - Max. 3,6 kg glyphosate/ha/12 mois. - Maximum 1 application. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Sapins de Noël (non destinés à la consommation) (plein air)	Mauvaises herbes	3-4,5 l/ha	Sur végétation développée et plantations de plus de 2 ans, en automne après lignification des jeunes pousses
	Conditions d'application : - Max. 3,6 kg glyphosate/ha/12 mois. - Maximum 1 application. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Gazons et pelouses; terrains de golf (plein air)	Mauvaises herbes	3-5,25 l/ha	Sur végétation développée, pour la destruction du gazon/de la pelouse avant installation ou renouvellement
	Conditions d'application : - Max. 3,6 kg glyphosate/ha/12 mois. - Maximum 1 application. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Prairies (plein air)	Mauvaises herbes	3-5,25 l/ha	Sur végétation développée, pour la destruction de la prairie avant installation ou renouvellement
	Conditions d'application : - Max. 3,6 kg glyphosate/ha/12 mois. - Maximum 1 application. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Terres agricoles en interculture	Mauvaises herbes	1,5-7,5 l/ha	Traitement localisé, y compris des chaumes, en fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La préle n'est que partiellement détruite. Sur végétation développée
	Plantes ligneuses	45 ml/5 l/100 m² badigeonnage ou pulvérisation à refus	Sur végétation développée
Terrains meubles, non cultivés en permanence	Mauvaises herbes	1,5-7,5 l/ha, 1 application	En fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La préle n'est que partiellement détruite. Sur végétation développée
	Plantes ligneuses	45 ml/5 l/100 m² badigeonnage ou pulvérisation à refus	Sur végétation développée
	Rejets et repousses	75 ml/5 l/100 m² badigeonnage	Sur végétation développée
	Conditions d'application : - Max. 3,6 kg glyphosate/ha/12 mois. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. - Délai d'attente pour la culture suivante : 7 jours avant de labourer le sol, semer ou planter.		

Terrains revêtus, non cultivables; chemins de fer	Mauvaises herbes	1,5-7,5 l/ha	Traitement localisé, en fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La préle n'est que partiellement détruite. Sur végétation développée
	Plantes ligneuses	45 ml/5 l/100 m² badigeonnage ou pulvérisation à refus	Sur végétation développée
	Rejets et repousses	75 ml/5 l/100 m² badigeonnage	Sur végétation développée
Toutes cultures	Mauvaises herbes	1,5-7,5 l/ha entre les lignes, sans toucher la culture 2,5-4,13 l/ha/10 l de bouillie par la technique de l'humectation	Sur végétation développée. 1 application. La préle n'est que partiellement détruite.
	Plantes ligneuses	45 ml/100 m² badigeonnage ou pulvérisation à refus	Sur végétation développée 1 application
	Rejets et repousses	75 ml/5 l/100 m² badigeonnage	Sur végétation développée
	Renouée du Japon, de Sakhaline et de Bohême (<i>Fallopia japonica</i> / <i>Fallopia sachalinensis</i> / <i>Fallopia x bohemica</i>)	6,75-7,5 l/ha par injection sous le 2e nœud visible de tiges de plus de 1,5 cm de diamètre	Sur végétation développée, à la fin de la saison de croissance. 1 application. Le taux de dilution, le nombre de tiges à traiter par m ² et le volume à injecter par tige sont fonction du matériel utilisé et du développement de la plante
	Conditions d'application : - Max. 3,6 kg glyphosate/ha/12 mois. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. - Délai avant récolte : 7 jours avant la fauche, l'ensilage ou le pâturage.		
	<ul style="list-style-type: none"> Un colorant „Carmoisine“ peut être ajouté à la bouillie pour marquer la zone et les plantes traitées. On observe une certaine incompatibilité associée à une diminution d'efficacité lorsque les herbicides résiduels sont utilisés en mélange avec les produits à base de glyphosate. Un traitement avec ce type d'herbicide sera effectué de préférence une semaine au moins après l'application du glyphosate. Le produit est absorbé par les feuilles et transporté vers les parties souterraines. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de pulvériser sur des mauvaises herbes bien développées aux feuilles vertes non infectées par des champignons ou endommagées par des insectes et non couvertes de boue. Il est possible que l'efficacité sur des mauvaises herbes souffrant de sécheresse ne réponde pas à l'attente. 		

- Conditions climatiques: Les meilleurs résultats sont obtenus par temps poussant avec un ciel couvert et une humidité élevée durant l'application. Un temps très ensoleillé, avec des températures excessives peut provoquer une destruction trop rapide des parties aériennes, entraînant ainsi un transport insuffisant vers les rhizomes/racines. Il n'est pas recommandé d'effectuer le traitement s'il y a risque de pluie dans les 4 à 6 heures suivant l'application, ou s'il y a risque de gelée prolongée.
- Volume d'eau : Il est recommandé de pulvériser 200 à 400 litres d'eau par hectare.

Remarque générale concernant la dose

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel.
- Le produit ne peut pas être appliqué sur des cultures destinées à la production de semences ou sur l'orge brassicole, en raison du risque d'inhibition de la germination.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique Usage et doses d'emploi.
- En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.
- Réduction de la dérive : Eviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses antidérive.

- Parcelles sensibles à l'érosion : Il est recommandé de mettre en place des mesures adaptées sur les parcelles sensibles à l'érosion afin d'empêcher le ruissellement vers les eaux de surface.

MESURES DE PRECAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.
- SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins	
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	
EN CAS D'INGESTION:	Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin. Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D'INHALATION:	Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:	En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Pour des informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.	

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur ; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Gevenaanduidingen H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen P280 Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding.
Aanvullende informatie EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Mentions de danger H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
Informations supplémentaires EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Gefahrenhinweise H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise P280 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Ergänzende Informationen EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Werkingswijze / Mode d'action:

GROUP	G	HERBICIDES
Roundup® PowerMax: Trademark of Bayer Group Lotnummer en productiedatum/ Numéro de lot et date de production: Zie op de verpakking/Voir sur l'emballage Label version: 12/2020 © Copyright Bayer MON30116060		



Toelatingshouder/Détenant de l'autorisation :
Bayer Agriculture BVBA
SCHELDELAAN 460 - HAVEN 627
2040 Antwerpen
Tel. 02/ 535 63 11

GEbruik EN GEbruIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstijdstip
Uien (drooggeogste) en bosuien (lente-ui) (open lucht)	Onkruiden	1,5-3 l/ha	Voor opkomst van de teelt (BBCH 01-08), op ontwikkelde vegetatie
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Maximum 1 toepassing. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Voederbieten en suikerbieten (open lucht)	Onkruiden	1,5-3 l/h	Voor opkomst van de teelt (BBCH 01-08), op ontwikkelde vegetatie
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Maximum 1 toepassing. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. – Veiligheidstermijn (suikerbieten): 7 dagen.		
Aardappelen (open lucht)	Onkruiden	1,5-3 l/h	Voor opkomst van de teelt (BBCH 01-08), op ontwikkelde vegetatie
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Maximum 1 toepassing. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht)	Onkruiden	1,5-3 l/h	Voor opkomst van de teelt (BBCH 01-08), op ontwikkelde vegetatie
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Maximum 1 toepassing. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Kerstparren (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)	Onkruiden	3-4,5 l/ha	Op ontwikkelde vegetatie en op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Maximum 1 toepassing. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Gazons en grasvelden; golfterreinen (open lucht)	Onkruiden	3-5,25 l/ha	Op ontwikkelde vegetatie, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of het grasveld aan te leggen of te vernieuwen
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Maximum 1 toepassing. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstijdstip
Grasland-weiland (open lucht)	Onkruiden	3-5,25 l/ha	Op ontwikkelde vegetatie, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het grasveld aan te leggen of te vernieuwen
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Maximum 1 toepassing. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. – Wachtijd voor volggevassen: 5 dagen wachten vóór bewerken, zaaien of planten.		
Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden	Onkruiden	1,5-7,5 l/ha	Plaatselijk behandeling, ook op stoppels. Afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling. 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd. Op ontwikkelde vegetatie
	Houtige planten	45 ml/5 l/100 m²	Op ontwikkelde vegetatie
	Opslag en scheuten	75 ml/5 l/100 m²	Op ontwikkelde vegetatie
Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. – Wachtijd voor volggevassen: 7 dagen wachten vóór bewerken, zaaien of planten.			
Niet verharde permanent onbeteelde terreinen	Onkruiden	1,5-7,5 l/ha	Afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd. Op ontwikkelde vegetatie
	Houtige planten	45 ml/5 l/100 m²	Op ontwikkelde vegetatie
	Opslag en scheuten	75 ml/5 l/100 m²	Op ontwikkelde vegetatie
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. – Wachtijd voor volggevassen: 7 dagen wachten vóór bewerken, zaaien of planten.		

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstijdstip
Verharde permanent onbeteelde terreinen; spoorwegen	Onkruiden	1,5-7,5 l/ha	Plaatselijk behandeling. Afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling. 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd. Op ontwikkelde vegetatie
	Houtige planten	45 ml/5 l/100 m²	Op ontwikkelde vegetatie
	Opslag en scheuten	75 ml/5 l/100 m²	Op ontwikkelde vegetatie
Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.			
Alle teelten	Onkruiden	1,5-7,5 l/ha	Op ontwikkelde vegetatie, tussen de rijen zonder de teelt te raken, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.
	Houtige planten	45 ml/100 m²	Op ontwikkelde vegetatie, 1 toepassing
	Opslag en scheuten	75 ml/5 l/100 m²	Op ontwikkelde vegetatie
	Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop (<i>Fallopia japonica</i> / <i>Fallopia sachalinensis</i> / <i>Fallopia x bohémica</i>)	6,75-7,5 l/ha	Op ontwikkelde vegetatie, einde van het groeiseizoen, 1 toepassing. De verdunning, het aantal te behandelen stengels/m ² en het te injecteren volume zijn afhankelijk van het materiaal en de ontwikkeling van de planten
Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3,6 kg glyfosaat /ha/12 maanden. – Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. – Veiligheidstermijn: 7 dagen voor het maaien, inkullen of beweiden.			

Algemene opmerkingen/aanbevelingen

- Er kan een „Carmoisine“ kleurstof toegevoegd worden om behandelde planten of oppervlakken te merken.
- Er bestaat een zekere incompatibiliteit, gepaard gaande met een verminderde doeltreffendheid, als herbiciden met een lange werking samen met middelen op basis van glyfosaat gebruikt worden. Daarom wordt aangeraden 1 week te wachten na toepassing van glyfosaat alvorens deze herbiciden toe te passen.
- Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van ziekten/ insectenvraat of van modder. Het effect op onkruiden die aan droogte lijden kan tegenvallen.
- Weersomstandigheden: Niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid tijdens de bespuiting. Geef de beste resultaten. Fel zonnig weer, met hoge temperaturen, veroorzaakt een te snelle doding van de bevoengrondse delen, waardoor onvoldoende transport kan plaatsvinden. Een toepassing is niet aan te bevelen als er binnen 4 à 6 uur kans op regen bestaat of bij aanhoudende vorst. Bij voorkeur spuiten op een droge vegetatie.
- Watervolume: 200 - 400 liter water per ha is aan te bevelen. Lagere watervolumes kunnen worden gebruikt, als de spuitapparatuur hiervoor geschikt is.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwergerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen. De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek “gebruik en gebruiksdosissen”.
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.
- Driftreductie: Vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen.
- Erosiegevoelige percelen: Het is ten eerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.
- Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen	
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.	
NA INSLIKKEN:	De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING:	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:	Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.	

Roundup® PowerMax

Gevarenaanduidingen

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

Informations supplémentaires

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Ergänzende Informationen

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Werkingswijze / Mode d'action:

GRUP

G

HERBICIDES

Roundup® PowerMax: Trademark of Bayer Group

Lotnummer en productiedatum/

Número de lot et date de production:

Zie op de verpakking/Voir sur l'emballage

Label version: 12/2020

© Copyright Bayer

MON30116060



www.agrirecover.eu

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation :

Bayer Agriculture BVBA

SCHDELAAAN 460 - HAVEN 627

2040 Antwerpen

Tel. 02/ 535 63 11



Antigifcentrum

(24 u. / 24 u.) +32 (0)70 245 245

Centre Antipoisons:

(24 hr. / 24 h(r.)) +32 (0)70 245 245